



程序資料

鼻腔活組織檢查 Nasal Biopsy

簡介

鼻腔活組織檢查是一項取出小塊鼻黏膜組織以作診斷的程序。通常會在鼻腔檢查期間，發現異常組織時進行。

檢查成效

取出鼻黏膜異常組織，並將之送往化驗，以協助診斷及決定治療方案。

檢查過程

鼻腔活組織檢查可用多種技術進行，醫生會視乎病人情況選取合適的技術。

1. 在病人的鼻腔噴入或注射局部麻醉藥物。
2. 從鼻黏膜採集一小塊異常組織。過程可用以下方式進行：
 - 鼻窺器：醫生使用金屬窺器和頭燈來觀察病變，並使用鑷子採集組織。
 - 內視鏡：醫生使用硬式或軟式內視鏡觀察可疑區域，並使用內視鏡專用器具採集組織。
3. 將取出的組織送往化驗。


可能出現的風險及併發症

1. 活檢部位出血
2. 感染

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。

檢查前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行檢查的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。如正服用影響血液凝固的藥物，例如阿士匹靈(Aspirin)、華法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或 Pradaxa(百達生)、中草藥及營養補充品，請儘早通知醫生。



圖片來源:

<http://eclinicalworks.adam.com/content.aspx?productid=39&pid=1&gid=003848>


檢查後須知

1. 檢查後的數天，抽取組織的位置可能會有輕微疼痛。可按需要服用醫生處方之止痛藥。
2. 抽取組織的位置少量出血屬正常現象。
3. 避免擤鼻或挖鼻數天。
4. 如持續鼻出血、鼻流出惡臭分泌物、寒顫、發熱(體溫高達 38°C 或 100°F 以上) 或其他異常情況，請即聯絡主診醫生或回院診治。
5. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此檢查有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。



由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知