



## 检查资料

### 鼻腔活组织检查 Nasal Biopsy

#### 简介

鼻腔活组织检查是一项取出小块鼻黏膜组织以作诊断的程序。通常会在鼻腔检查期间，发现异常组织时进行。

#### 检查效果

此程序可取出鼻黏膜异常组织，进行活检协助诊断及决定治疗方案。

#### 检查过程

鼻腔活组织检查可用多种技术进行，医生会根据患者情况采取合适的技术。

1. 在患者的鼻腔喷入或注射局部麻醉药；
2. 从鼻黏膜采集一小块异常组织。可用以下方式进行：
  - 鼻窥器：医生使用金属窥器和头灯观察病变，并使用镊子采集组织；
  - 内视镜：医生使用硬式或软式内视镜观察可疑区域，并使用内视镜专用器具采集组织；
3. 将取出的组织送往检验。


#### 可能出现的风险及并发症

1. 活检部位出血
2. 刀口感染

\*\* 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论程序如何妥善，仍有出现并发症的风险。

#### 检查前的准备

1. 医生会向患者解释检查的原因、过程及可能出现的并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百达生(Pradaxa)、中草药及营养补充品，请尽早通知医生。



图片来源:

<http://eclinicalworks.adam.com/content.aspx?productid=39&pid=1&gid=003848>

## 检查后须知

1. 检查后的数天，抽取组织的部位可能会有轻微疼痛。可按需要服用医生处方止痛药。
2. 抽取组织的部位少量出血属正常现象。
3. 避免擤鼻子或抠鼻数天。
4. 如持续鼻出血、鼻子流出恶臭分泌物、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主治医生或回院治疗。
5. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主治医生。

经过医生的悉心治疗，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

---

---

---

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询  
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知