



程序資料

舌繫帶鬆解術 Tongue-Tie Release / Tie Cutting

簡介

舌繫帶過短是一種先天性發育異常，它限制了舌頭的活動能力，此症狀常見於男性的兒童。舌繫帶過短有可能引致進食困難、影響語言能力。舌繫帶鬆解術是一項簡單手術，把連接在舌底過短及過緊的舌繫帶切開。

治療成效

此程序可顯著改善舌頭的活動能力及有助母乳餵哺，亦有利於語言發展。

過程

1. 此程序可在沒有麻醉、局部麻醉或全身麻醉下進行；
2. 使用無菌剪刀迅速地切開舌繫帶；
3. 可能會以激光/電烙術代替剪刀。


可能出現的風險及併發症

1. 傷口出血
2. 傷口感染
3. 牙齒、嘴唇、牙齦或舌頭受損

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人/家長/監護人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。

程序前的預備

1. 醫生會向病人/家長/監護人解釋施行程序的原因、過程及可能出現之併發症，家長或監護人明白後便可簽署同意書。
2. 病人/家長/監護人應告知醫生及護士所有有關病人的以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 程序前6小時禁止飲食。(只適用於全身麻醉)
4. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。(只適用於全身麻醉)



圖片來源:

<https://osourimbah.com/wp-content/uploads/2017/11/Untitled-51.png>

程序後須知

一般情況

1. 程序後如感到傷口疼痛，可服用醫生處方之止痛藥。
2. 激光或電烙術後，舌頭上可能會出現輕微灼傷(細小白色部份)，此傷口一般會很快痊癒。

出院後注意事項

1. 如傷口部位疼痛加劇或出現紅腫、滲膿、大量出血、寒顫、發熱(體溫高達 38°C 或 100.4°F 以上)或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
2. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知