

手术资料

舌系带松解术 Tongue-Tie Release / Tie Cutting

简介

舌系带过短是一种先天性发育异常，它限制了舌头的活动能力，此症状常见于男童。舌系带过短有可能引致进食困难，影响语言能力。舌系带松解术是一项简单手术，把连接在舌底过短及过紧的舌系带切除。

治疗效果

可显著改善舌头的活动能力，有助母乳喂养。更重要的是可改善语言能力。

过程

1. 可在没有麻醉、局部麻醉或全身麻醉下进行
2. 切除舌系带
3. 可能会用激光/电烙术代替剪刀

可能出现的风险及并发症

1. 感染
2. 出血
3. 牙齿、嘴唇、牙龈或舌头受损

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患儿/家长/监护人应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。

手术前的准备

1. 医生会向家长/监护人解释施行手术的原因、过程及可能出现之并发症，家长或监护人明白后便须签署同意书。
2. 家长/监护人应告知医生及护士所有有关患儿的以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 术前6小时禁止饮食。(只适用于全身麻醉)
4. 除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。(只适用于全身麻醉)

手术后须知

一般情况

1. 术后如感到疼痛，可服用医生处方之止痛药。
2. 激光或电烙术后，舌头上可能会出现轻微灼伤(白色部分)，此伤口一般会很快痊愈。

出院后注意事项

1. 如刀口部位的疼痛加剧或出现红肿、渗脓、大量出血，患儿出现寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
2. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记住相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知