



手術資料

鼻骨骨折閉合性復位術 Closed Reduction of Fracture Nose

簡介

鼻骨折是一項常見的面部創傷，通常因進行接觸性劇烈運動、打架、跌倒或交通意外而引致。鼻骨折通常會令鼻樑出現腫脹，鼻子的外觀及形狀亦會變得異常。

鼻骨骨折閉合性復位術是一項毋須在皮膚做任何切口，而令折斷的鼻骨復位的程序。如鼻子出現阻塞或彎曲，便可能需要進行鼻骨骨折閉合性復位術。



圖片來源：

<https://surgeryreference.aofoundation.org/cmft/trauma/midface/nasal-bone/closed-reduction#reduction-of-nasal-bones>

適應症

1. 鼻骨單側或雙側骨折

治療成效

此手術用於矯正及修復折斷的鼻骨，從而改善鼻外觀異常的問題或減低因鼻骨偏曲而引起的鼻塞症狀。

過程

1. 手術會在全身或局部麻醉下進行。
2. 由鼻腔放入工具，將鼻斷骨復位。

可能出現的風險及併發症

1. 出血
2. 感染
3. 持續鼻塞
4. 鼻腔粘連
5. 鼻中隔血腫
6. 持續鼻畸形

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善，仍有出現併發症的風險。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術治療這些併發症。

手術前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行手術的原因、程序及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 病人應告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 可能須要進 X 光檢查或電腦掃描。
4. 如手術以全身麻醉進行，術前 6 小時禁止飲食。
5. 可能須要脫下身上所有衣物 (例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
6. 手術前請先排清小便。

手術後須知

一般情況

1. 全身麻醉後，病人可能會：
 - 因麻醉時曾插喉而引致喉部輕微不適或疼痛；
 - 出現麻醉藥的副作用，包括疲倦、渴睡、噁心或嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。
2. 如傷口感到疼痛，可通知護士，護士會按醫生指示為病人注射止痛針或提供口服止痛藥。

鼻的護理

1. 避免按壓或觸碰傷口。
2. 病人可能會有輕微鼻出血，此乃正常現象。

飲食

待麻醉藥效消退後，便可逐漸恢復正常飲食。

出院後注意事項

1. 請遵照醫生指示服用藥物。
2. 術後兩星期內，避免進行游泳、劇烈或競技運動。
3. 依從上列鼻的護理指引。
4. 如出現呼吸困難、大量鼻出血、流出膿液、疼痛加劇、寒顫、發熱(體溫高達 38°C 或 100°F 以上) 或其他異常情況，請即聯絡主診醫生或回院診治。
5. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

