



手术资料

鼻骨骨折闭合性复位术 Closed Reduction of Fracture Nose

简介

鼻骨折是一项常见的面部创伤，通常因接触性剧烈运动、打架、跌倒或交通意外而引致。鼻骨折通常会令鼻梁出现肿胀，鼻子的外观及形状也会变得异常。

鼻骨骨折闭合性复位术是一项毋须在皮肤表面切口，而令折断的鼻骨复位的手术。如鼻子出现阻塞或弯曲，便可能需要进行鼻骨骨折闭合性复位术。



图片来源:

<https://surgeryreference.aofoundation.org/cmft/trauma/midface/nasal-bone/closed-reduction#reduction-of-nasal-bones>

适应症

1. 鼻骨单侧或双侧骨折

治疗效果

矫正及修复折断的鼻骨，从而改善鼻外观异常问题或减低因鼻骨偏曲而引起的鼻塞症状。

过程

1. 手术会在全身或局部麻醉下进行。
2. 从鼻腔放入工具，将鼻断骨复位。

可能出现的风险及并发症

1. 出血
2. 感染
3. 持续鼻塞
4. 鼻腔粘连
5. 鼻中隔血肿
6. 持续鼻畸形

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

手术前准备

1. 医生会向患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 可能需要做 X 光检查或电脑扫描。
4. 如手术以全身麻醉进行，术前 6 小时禁止饮食。
5. 可能需要除去身上所有衣物 (如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
6. 手术前请先排清小便。

手术后须知

一般情况

1. 全身麻醉后，患者可能会：
 - 因麻醉时曾插管而引致喉部轻微不适或疼痛；
 - 出现麻醉药的副作用，包括疲倦、渴睡、恶心或呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。
2. 如刀口部位疼痛，可通知护士，护士会按医生指示注射止痛针或提供口服止痛药。

鼻的护理

1. 请勿按压或触碰刀口。
2. 可能会有轻微鼻出血，此为正常现象。

饮食

待麻醉药作用消退后，便可逐渐恢复正常饮食。

出院后注意事项

1. 请遵照医生指示服用药物。
2. 术后两星期内，请勿游泳、做剧烈或竞技运动。
3. 遵从上列鼻的护理指引。
4. 如出现呼吸困难、大量鼻出血、流出脓液、疼痛加剧、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上) 或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
5. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

