



检查资料

显微喉镜检查术 Micro-Laryngoscopy

简介

显微喉镜检查术是把喉镜经口腔放进喉部，利用显微镜检查喉部及邻近组织、进行活组织检查及透过喉镜进行其它手术。在某些情况下，医生可能会建议患者采用内视镜导引进行激光治疗(视乎患者的情况而定)。

适应症

1. 检查喉部病变、狭窄部位或异物
2. 去除喉部良性病变组织或异物
3. 协助诊断喉癌或声带损伤
4. 评估喘鸣、咳血或吞咽障碍等咽喉问题

预期效果

此检查的预期效果取决于不同的适应症：

- 改善发音
- 解除气道阻塞
- 活组织检查
- 切除病变组织
- 未必能全部清除病灶和有可能复发
- 因结构问题而未能成功达至喉镜目的

手术不能解决的问题：

- 功能性发音病变

检查过程

1. 检查会在全身麻醉下进行；
2. 从口腔放进喉镜；
3. 检查喉部、声带、喉头及周边组织；
4. 需要时会收集标本作进一步化验。

可能出现的风险及并发症

1. 常见副作用和并发症 (≥1% 风险)
 - 1.1 出血
 - 1.2 疼痛
 - 1.3 感染
 - 1.4 口咽组织损伤
2. 不常见的严重风险或并发症 (<1% 风险)
 - 2.1 牙齿脱落、裂伤、疼痛
 - 2.2 颞颌关节损伤、引致疼痛、牙关紧闭和半脱臼

- 2.3 声音改变
 - 2.4 上呼吸道阻塞
 - 2.5 术后肺水肿
 - 2.6 颈椎损伤
 - 2.7 失去味觉 (暂时或永久)
 - 2.8 由于手术或麻醉的严重并发症引致死亡
3. 不治疗的后果
 - 3.1 无病理诊断
 - 3.2 病情恶化

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者的风险程度不同。患者应明白无论检查如何妥善，仍会有出现并发症的风险，也可能需要进行另一程序或手术治疗这些并发症。如有查询，请联络医生。

检查前的准备

1. 医生会向患者解释检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 检查前6小时禁止饮食。
4. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
5. 检查前请先排清小便。

检查后须知

一般情况

1. 全身麻醉后，患者可能会：
 - 因麻醉时曾插管而引致喉部轻微不适或疼痛；
 - 出现麻醉药的副作用，包括疲倦、渴睡、恶心或呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。
2. 建议检查后略微抬高头部侧卧以防止吸入性肺炎。
3. 观察痰液中有否带血现象，如有大量出血或呼吸困难，请即通知护士跟进。

饮食

禁止饮食直至恢复呕吐反应(通常约两小时)。

活动

根据患者情况可在检查当天下床活动，尽早下床能有助迅速康复。

出院后注意事项

1. 一般患者可在检查当天出院。
2. 如出现严重喉部疼痛、大量出血、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上) 或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
3. 请按时复诊。

其他治疗 / 检查方法

1. 观察病情进展，再作打算
2. 药物治疗
3. 语言治疗
4. 放射治疗或化疗 (恶性肿瘤)

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

