

检查资料

显微喉镜检查术 Micro-Laryngoscopy

简介

显微喉镜检查术是把喉镜经口腔放进喉部，利用显微镜检查声带及喉头周边的组织。在某些情况下，医生可能会建议患者采用内视镜导引进行激光治疗。

适应症

1. 检查喉头病变、狭窄部位或异物
2. 去除喉头良性病变组织或异物
3. 协助诊断喉癌或声带受损的问题
4. 评估喘鸣、咳血或吞咽障碍等咽喉症状

治疗效果

此检查的预期效果取决于不同的适应症，可清除良性肿瘤或异物，并能协助诊断及检验。

检查过程

1. 检查会在全身麻醉下进行；
2. 从口腔放进喉镜；
3. 检查喉部、声带、喉头及周边组织；
4. 需要时会采集标本进一步检验。

可能出现的风险及并发症

1. 感染
2. 舌头、嘴唇或牙齿受损
3. 口腔或喉部溃疡
4. 声带痉挛引致呼吸困难

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论检查如何妥善，仍会有出现并发症的风险，也可能需要进行另一程序或手术治疗这些并发症。

检查前的准备

1. 医生会向患者解释施行检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 检查前6小时禁止饮食。
4. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
5. 检查前请先排清小便。

检查后须知

一般情况

1. 全身麻醉后，患者可能会：
 - 因麻醉时曾插管而引致喉部轻微不适或疼痛；
 - 出现麻醉药的副作用，包括疲倦、渴睡、恶心或呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。
2. 建议检查后略微抬高头部侧卧以防止吸入性肺炎。
3. 观察痰液中有否带血现象，如有大量出血或呼吸困难，请即通知护士跟进。

饮食

禁止饮食直至恢复呕吐反应(通常约两小时)。

活动

可在检查当天下床活动，尽早活动能有助迅速康复。

出院后注意事项

1. 可在检查当天出院。
2. 如出现严重喉部疼痛、大量出血、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上) 或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
3. 请按时复诊。

如您对此检查有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知