



程序資料

鼻咽喉鏡檢查 Naso-laryngoscopy

簡介

鼻咽喉鏡檢查是一種既快捷亦簡單的檢查，此檢查可觀察鼻管或咽喉的變化以確定病徵的成因。

適應症

1. 鑑定鼻竇症狀
2. 取出膿性分泌物作化驗
3. 清除阻塞鼻腔及功能性內視鏡鼻竇術後鼻竇腔內的硬皮、黏液及血絲
4. 監察鼻腔腫瘤復發
5. 評估：
 - 病人服藥後的反應
 - 單側鼻竇疾病
 - 鼻竇炎的併發症
 - 鼻咽淋巴組織增生、耳咽管問題及鼻腔阻塞
 - 腦脊髓液滲漏
 - 嗅覺減退及喪失症
 - 鼻腔腫塊及病變
6. 評估及治療：
 - 鼻腔出血
 - 鼻腔內的異物

治療成效

此檢查的預期成效是取決於不同的適應症，它可清除良性腫瘤或異物，並能協助診斷及評估鼻咽問題。

檢查過程

1. 此檢查會在局部麻醉下進行(局部麻醉噴藥可能會發出不太討好的味道)；
2. 把一條細小、有彈性及尾部發光的內視鏡(纖維光束內視鏡)放入鼻孔，透過內視鏡直接觀察鼻腔及咽喉；
3. 醫生可能會要求病人伸出舌頭及說話以震動聲帶，以觀察咽喉內的隱蔽位置；
4. 完成檢查後，醫生會迅速及輕易地移除內視鏡；
5. 此檢查不會影響呼吸，通常可於2分鐘內完成；
6. 醫生會於稍後向病人解釋檢查結果。

可能出現的風險及併發症

短暫性的流眼水、打噴嚏及鼻腔出血

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。可能需要進行另一手術治療這些併發症。

檢查前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行檢查的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。

檢查後須知

1. 如感到鼻腔疼痛，可通知護士，護士會按醫生指示為病人注射止痛針或提供口服止痛藥。
2. 局部麻醉後，咽喉可能會感到麻痺約一小時。
3. 一般情況下，待麻醉藥效消退後，便可恢復正常飲食，毋需戒口。

出院後注意事項

1. 如感到鼻腔內嚴重疼痛或大量出血、寒顫、發熱(體溫高達 38°C 或 100°F 以上) 或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
2. 請於指定的日期、時間及地點覆診。

如病人對此檢查有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知