



檢查資料


鼻咽喉镜检查 Naso-laryngoscopy

简介

鼻咽喉镜检查是一种既快捷又简单的检查，此检查可观察鼻腔或咽喉的变化以确定病征的成因。

适应症

1. 鉴定鼻窦症状
2. 取出脓性分泌物化验
3. 清除阻塞鼻腔及功能性内视镜鼻窦术后鼻窦腔内的硬皮、黏液及血丝
4. 监察鼻腔肿瘤复发
5. 评估：
 - 服药后的反应
 - 单侧鼻窦疾病
 - 鼻窦炎的并发症
 - 鼻咽淋巴组织增生、耳咽管问题及鼻腔阻塞
 - 脑脊髓液渗漏
 - 嗅觉减退及丧失症
 - 鼻腔肿块及病变
6. 评估及治疗：
 - 鼻腔出血
 - 鼻腔内的异物



图片来源:

https://thanguide.org/wp-content/uploads/2020/01/27-nasal_scope-Artboard-1@2x.png.webp

治疗效果

取决于不同的适应症，可清除良性肿瘤或异物，并能协助诊断及评估鼻咽问题。

检查过程

1. 检查会在局部麻醉下进行(局部麻醉喷药可能会有不太好的味道)；
2. 把一条细小、有弹性及尾部发光的内视镜(纤维光束内视镜)放入鼻孔，透过内视镜直接观察鼻腔及咽喉；
3. 医生可能会要求患者伸出舌头及说话以震动声带，观察咽喉内的隐蔽位置；
4. 完成检查后，移除内视镜；
5. 此检查不会影响呼吸，通常可在2分钟内完成；
6. 稍后医生会向患者解释检查结果。

可能出现的风险及并发症

短暂性的流泪、打喷嚏及鼻腔出血

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论检查如何妥善，仍有出现并发症的风险。可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

检查前的准备

1. 医生会向患者解释检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。

检查后须知

1. 如感到鼻腔疼痛，可通知护士，护士会按医生指示注射止痛针或提供口服止痛药。
2. 局部麻醉后，咽喉可能会感到麻痹约一小时。
3. 一般情况下，麻醉药作用消退后，便可恢复正常饮食，毋需忌口。

出院后注意事项

1. 如感到鼻腔内疼痛加剧或大量出血、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上) 或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
2. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心治疗，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知