

手術資料

眼瘡 – 切開及刮除術 Chalazion - Incision & Curettage

簡介

眼瘡是一種常見的良性眼疾，是由於上或下眼瞼油脂腺被堵塞，再受細菌感染，因而長出膿瘡。如保守治療失敗，症狀沒有好轉，醫生可能會建議進行小手術（切開和刮除）。請與主診醫生商討以決定最佳的治療方案。

治療成效

此手術可切除眼瘡，有效預防再次感染及復發。

手術過程

1. 此程序在眼皮注射局部麻醉藥或局部麻醉下進行；
2. 在眼瘡上開一小傷口；
3. 利用儀器將瘡內的膿擠出；
4. 即使在注射局部麻醉藥後，手術過程時亦可能會有相當的痛楚；
5. 手術過程需時大約三至五分鐘。

可能出現的風險及併發症

1. 流血
2. 起疤痕（一般情況下，傷口會在眼皮下，外觀不會受影響；但有時傷口需要開在表皮上，手術後便可能留有疤痕）
3. 眼瘡持續不退或復發
4. 細菌感染
5. 形成肉芽
6. 病人在手術過程中突然移動導致眼球或其附近組織受傷

** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善，仍有發生併發症的風險。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術治療這些併發症。



手術前的預備

1. 保持個人衛生可預防外科傷口感染。
2. 醫生會向病人解釋施行手術的原因、程序及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。如正服用影響血液凝固的藥物，例如阿士匹靈(Aspirin)、華法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或 Pradaxa(百達生)或非類固醇抗炎藥，例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中藥，請儘早通知醫生。
4. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。請勿於面部或眼部塗搽面霜、眼霜、乳液或化妝品。
5. 手術前請先排清小便。

手術後須知

手術完成後，需要利用紗布用力按著眼睛十至十五分鐘以收止血之效。

出院後注意事項

1. 按照醫生指示，回家後眼部仍需繼續使用熱敷。
2. 依醫生指示滴用抗生素眼藥水。
3. 眼瘡可能需要數星期才痊癒，亦有可能需要接受數次手術才可康復。眼瘡的厚壁可能需要時間才能平伏，所以病人在一至兩週內仍有機會感到眼皮有硬粒。若眼瘡附近的眼皮有紅、腫、熱和痛的跡象，便代表可能被細菌感染，醫生會給病人一個療程的口服或滴眼抗生素來控制感染，之後才再次進行手術。
4. 保持良好的個人衛生可減低感染的風險，尤其是眼部和手部衛生。
5. 如傷口部位出現流血、紅腫或發熱、流出黏稠的黃或綠色分泌物或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
6. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知