




手术资料

眼疮 – 切开及刮除术 Chalazion - Incision & Curettage

简介

眼疮是一种常见的良性眼疾，是由于上或下眼睑油脂腺被堵塞，再受细菌感染，因而长出脓疮。如保守治疗失败，症状没有好转，医生可能会建议进行小手术（切开和刮除）。请与主诊医生商讨决定最佳的治疗方案。



图片来源:
<https://vissioneyes.com/img/service/schalazion.jpg>

治疗效果

此手术可切除眼疮，有效预防再次感染及复发。

手术过程

1. 手术一般在局部麻醉下进行；
2. 在眼疮上切一小切口；
3. 用仪器将疮内的脓挤出；
4. 即使在注射局部麻醉药后，手术过程时也可能感到相当的疼痛；
5. 手术过程需时大约三至五分钟。

可能出现的风险及并发症

1. 刀口出血
2. 刀口感染
3. 刀口疤痕（一般情况下，切口会在眼皮下，外观不会受影响；但有时切口需要开在表皮上，手术后便可能留有疤痕）
4. 刀口长出肉芽
5. 眼疮持续不退或复发
6. 患者在手术过程中突然移动导致眼球或其附近组织受伤

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防刀口感染。
2. 医生会向患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百达生(Pradaxa)或非类固醇抗炎药，例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中药，请尽早通知医生。
4. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。请勿于面部或眼部涂面霜、眼霜、乳液或化妆品。
5. 手术前请先排清小便。

手术后须知

手术完成后，需要用纱布用力按着眼睛十至十五分钟止血。

出院后注意事项

1. 按照医生指示，回家后眼部仍需继续热敷。
2. 请按医生指示使用眼药水或眼药膏。
3. 眼疮可能需要数星期才能痊愈，也有可能需要接受数次手术才可康复。眼疮的厚壁需要时间才能平伏，所以在一至两周内仍有可能感到眼皮有硬粒。若眼疮附近的眼皮有红、肿、热和痛的情况，便表示可能被细菌感染，需要一个疗程的口服或滴眼抗生素来控制感染，才能再次进行手术。
4. 保持良好的个人卫生可减低感染的风险，尤其是眼部和手部卫生。
5. 如刀口部位出血、红肿或发热、流出黏稠的黄或绿色分泌物或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
6. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记住相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

