




外科程序資料

眼底螢光造影

Fundal Fluorescent Angiogram / Fundus Fluorescein Angiography (FFA)

簡介

眼底螢光造影是一種視光學檢查，並非治療，其作用為評估眼底脈絡膜及視網膜之血液循環。可協助診斷眼疾、跟進眼疾病情進展及衡量進一步治療(例如激光治療)的可行性。



圖片來源：
<http://www.pjsaine.com/OphthalmicPhotography/PJSOPRetina.html>

治療成效

此程序可使醫生得到更多關於病人的視網膜症狀資料，有助於診斷以決定最佳的治療方案。

程序過程

1. 將造影劑(螢光劑)經靜脈注射，注射部位通常是手背或手臂；
2. 配合使用閃光燈，攝影一連串的照片，需時通常約十五分鐘。

可能出現的風險及併發症

眼底螢光造影的併發症非常罕有，絕大部份人士除在注射時感到刺痛外，並沒有其他不適。病人的眼白會短暫呈現黃色。以下是偶爾或有可能出現的併發症：

1. 小部份人士在注射期間會有短暫噁心。
2. 出現過敏性皮炎(少於1%)，情況通常持續數天並且容易治療。也有極少數人士注射範圍的皮膚出現發炎或皮膚潰爛現象或感到呼吸困難。
3. 嚴重過敏性反應如暈厥或休克(少於0.01%)。
4. 因休克導致死亡(少於0.001%)。

** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有發生併發症的風險。

程序前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、程序及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 現已懷孕或計劃懷孕之婦女，請告知護士。
4. 如正在餵哺母乳，請告知護士。
5. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。請勿於面部或眼部塗搽面霜、眼霜、乳液或化妝品。
6. 程序前請先排清小便。

程序過程中

此程序會先滴擴瞳眼藥水把瞳孔放大，整個過程需時約三十分鐘，眼藥水會令視力暫時變得模糊。

程序後須知

一般情況

1. 注射螢光劑後，皮膚可能會變黃，約六至十二小時後便會恢復正常。檢查當天及翌日體液(例如尿液)可能會呈橙黃色。

活動

1. 程序後六小時內，請勿駕駛或操作機器。
2. 如沒有任何不適，便可恢復正常活動。

出院後注意事項

1. 如有任何不適或其他異常情況，請即聯絡主診醫生或回院診治。
2. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

