



外科检查资料

眼底荧光造影

Fundal Fluorescent Angiogram / Fundus Fluorescein Angiography (FFA)

简介

眼底荧光造影是一种视光学检查，并非治疗，其作用为评估眼底脉络膜及视网膜之血液循环。可协助诊断眼疾、跟进眼疾病情进展及衡量进一步治疗(例如激光治疗)的可行性。

治疗效果

此检查可使医生得到更多关于患者的视网膜症状的资料，有助诊断可决定最佳的治疗方案。

检查过程


1. 将造影剂(荧光剂)经静脉注射，注射部位通常是手背或手臂；
2. 配合使用闪光灯，拍摄一连串的照片，需时通常约十五分钟。

可能出现的风险及并发症

眼底荧光造影的并发症非常罕有，绝大部分人除在注射时感到刺痛外，并没有其他不适。患者的眼白会短暂呈现黄色。以下是偶尔或有可能出现的并发症：

1. 小部分人在注射期间会有短暂恶心。
2. 出现过敏性皮疹(少于1%)，情况通常持续数天并且容易治疗。也有极少数人注射范围的皮肤出现发炎或皮肤溃烂现象或感到呼吸困难。
3. 严重过敏性反应如晕厥或休克(少于0.01%)。
4. 因休克导致死亡(少于0.001%)。

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论过程如何妥善，仍有出现并发症的风险。



图片来源:
<http://www.pjsaine.com/OphthalmicPhotography/PJSOPRetina.html>

检查前的准备

1. 医生会向患者解释做此检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 现已怀孕或计划怀孕者，请告知护士。
4. 如正在喂母乳，请告知护士。
5. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。请勿于面部或眼部涂面霜、眼霜、乳液或化妆品。
6. 检查前请先排清小便。

检查过程中

检查前先滴散瞳眼药水把瞳孔放大，整个过程需时约三十分钟，眼药水会令视力暂时变得模糊。

检查后须知

一般情况

1. 注射荧光剂后，皮肤可能会变黄，约六至十二小时后便会恢复正常。检查当天及翌日体液(如尿液)可能会呈橙黄色。

活动

1. 检查后六小时内，请勿驾驶或操作机器。
2. 如没有任何不适，便可恢复正常活动。

出院后注意事项

1. 如有任何不适或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
2. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知