



手術資料

結膜下注射 (Subconjunctival Injection)

簡介

結膜下注射是將藥物注入結膜與鞏膜間的疏松間隙組織內，以提高及延長藥效。然而，注射過程可能會引起不適及恐懼，藥物亦可能會留在眼睛數天或數星期。請與主診醫生商討以決定最佳的治療方案。



可用作結膜下注射的常用藥物

1. 局部麻醉劑
2. 類固醇激素
3. 抗生素和抗真菌藥物
4. 抗代謝藥物[如 5-FU，Mitomycin(絲裂霉素)]等

適應症

1. 眼睛感染(例如角膜潰瘍)
2. 眼睛嚴重發炎
3. 在眼科手術中，加強局部麻醉
4. 治療眼部疾病(例如青光眼手術)

治療成效

此程序的預期成效是可以通過結膜下注射利用處方藥物來治療眼部疾病。

手術過程

此手術需要病人充分的配合才能順利完成。

1. 以無菌技術進行
2. 病人可選擇坐或仰臥的姿勢進行
3. 在患眼滴上局部麻醉眼藥水
4. 針頭刺入結膜下，然後注射藥物
5. 注射後立即將針頭撤走
6. 手術後需滴上外用抗生素以預防感染

可能出現的風險及併發症

1. 紅腫、發炎及疼痛
2. 感染
3. 結膜下出血
4. 藥物的不良反應，包括對眼藥水敏感
5. 因緊張或血管迷走性暈厥所致的片刻性暈倒(通常很快復原)

6. 角膜、鞏膜和結膜壞死(不常見)
7. 眼球穿孔(不常見)
8. 失明(非常罕見，通常是因為潛在性疾病所致)

** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善，仍有發生併發症的風險。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術治療這些併發症。

手術前的預備

1. 保持個人衛生可預防感染。
2. 醫生會向病人解釋施行手術的原因、程序及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。如正服用影響血液凝固的藥物，例如阿士匹靈(Aspirin)、華法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或 Pradaxa(百達生)或非類固醇抗炎藥，例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中藥，請儘早通知醫生。
4. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。請勿於面部或眼部塗搽面霜、眼霜、乳液或化妝品。
5. 手術前請先排清小便。

手術後須知及出院後注意事項

1. 如有需要，可服用醫生處方之止痛藥。
2. 短期內，請避免佩戴隱形眼鏡，詳情請向醫生查詢。
3. 短期內，請避免進行游泳及眼部化妝，詳情請向醫生查詢。
4. 如感到眼睛劇痛或視力模糊或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
5. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知