



手术资料

结膜下注射 (Subconjunctival Injection)

简介

结膜下注射是将药物注入结膜与巩膜间的疏松间隙组织内，可以提高及延长药效。注射过程可能会引起不适及恐惧，药物会留在眼睛数天或数星期。请与主诊医生商讨决定最佳的治疗方案。

可用作结膜下注射的常用药物

1. 局部麻醉剂
2. 类固醇激素
3. 抗生素和抗真菌药物
4. 抗代谢药物[如 5-FU，Mitomycin(丝裂霉素)]等

适应症

1. 眼睛感染(例如角膜溃疡)
2. 眼睛严重发炎
3. 眼科手术中，加强局部麻醉作用
4. 治疗眼部疾病(例如青光眼手术)

治疗效果

药物可以通过结膜下注射治疗眼部疾病。

手术过程

手术需要患者充分配合才能顺利完成。

1. 以无菌技术进行
2. 患者可选择坐或仰卧的姿势进行
3. 在患眼用局部麻醉眼药水
4. 针头刺入结膜下，然后注射药物
5. 注射后立即将针头拔出
6. 手术后需点抗生素眼药水预防感染

可能出现的风险及并发症

1. 红肿、发炎及疼痛
2. 感染
3. 结膜下出血
4. 药物的不良反应，包括对眼药水过敏
5. 因紧张或血管迷走性晕厥所致的片刻性晕倒(通常很快复原)



6. 角膜、巩膜和结膜坏死(不常见)
7. 眼球穿孔(不常见)
8. 失明(非常罕见，通常是因为潜在性疾病所致)

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防感染。
2. 医生会向患者解释做手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或 Pradaxa(百达生)或非类固醇抗炎药，例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中药，请尽早通知医生。
4. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。请勿于面部或眼部擦面霜、眼霜、乳液或化妆品。
5. 手术前请先排清小便。

手术后须知及出院后注意事项

1. 如有需要，可服医生处方的止痛药。
2. 短期内，请勿佩戴隐形眼镜，详情请向医生查询。
3. 短期内，请勿游泳及眼部化妆，详情请向医生查询。
4. 如感到眼睛剧痛或视力模糊或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
5. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知