


## 程序資料

### 玻璃體注射血管內皮生長因子抑制藥物

## Intravitreal Injection of Anti-Vascular Endothelial Growth Factors Drug

### 簡介

血管內皮生長因子(VEGF)是一種促進血管增生的蛋白質。臨床上有很多眼科疾病都會引致血管增生，例如：老年性黃斑部病變及濕性老年黃斑病變，它們都是由於視網膜內出現不正常的血管增生，而增生的血管較脆弱，容易滲漏和出血，以致造成黃斑部水腫，從而令視力下降，甚至失明。



### 治療成效

注射血管內皮生長因子抑制藥物可阻止增生血管生長，從而減低血管滲漏和出血。病人一般需在指定的時期內接受注射療程，治療效果顯著，多數病人的視力都能得以改善。

### 注射過程

1. 協助病人躺於手術椅或床上
2. 替病人滴上麻醉眼藥水進行局部麻醉
3. 利用一細小工具(擴張器)把眼睛張開
4. 注射前先滴上麻醉及抗生素眼藥水
5. 把藥物經幼小針頭注射至眼球玻璃體內
6. 注射後，評估病人視力
7. 滴上抗生素眼藥水

### 可能出現的風險及併發症

1. 感染
2. 視網膜脫落
3. 眼壓升高
4. 眼睛出現血塊或出血
5. 眼內發炎
6. 白內障
7. 心臟病發(罕見)
8. 中風(罕見)

\*\* 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。

## 注射前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行注射的原因、程序及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
4. 注射前請先排清小便。

## 注射後須知

1. 病人可能會出現結膜下(眼白)出血或充血，但此情況會於一至兩星期內逐漸消失。
2. 注射後的一至兩天，注射位置可能會疼痛及有異物感。
3. 避免眼睛沾水。

## 出院後注意事項

1. 按醫生指示使用抗生素眼藥水。
2. 注射後的數天會出現紅眼及不適等徵狀，此乃正常現象。
3. 注射後的數天避免眼睛沾水或游泳。
4. 視乎療程需要，病人可能需於預約的時間內注射另一次的血管內皮生長因子抑制藥物。
5. 如眼睛的紅腫加劇、怕光、腫痛、視力模糊、寒顫、發熱(體溫高於 38°C 或 100°F) 或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
6. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

---

---

---

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢  
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知