




## 程序資料

### 玻璃體注射血管內皮生長因子抑制藥物

## Intravitreal Injection of Anti-Vascular Endothelial Growth Factors Drug

### 簡介

血管內皮生長因子(VEGF)是一種促進血管增生的蛋白質。臨床上有很多眼科疾病都會引致血管增生，例如：老年性黃斑部病變及濕性老年黃斑病變，它們都是由於視網膜內出現不正常的血管增生，而增生的血管較脆弱，容易滲漏和出血，以致造成黃斑部水腫，從而令視力下降，甚至失明。



圖片來源：

<https://sa1s3optim.patientpop.com/assets/images/provider/photos/2105685.jpeg>

### 治療成效

注射血管內皮生長因子抑制藥物可阻止增生血管生長，從而減低血管滲漏和出血。病人一般需在指定的時期內接受注射療程，治療效果顯著，多數病人的視力都能得以改善。

### 注射過程

1. 在患眼滴上局部麻醉眼藥水；
2. 病人需躺於手術椅或床上；
3. 利用細小擴張器把眼睛張開；
4. 注射前先滴上麻醉及抗生素眼藥水；
5. 把藥物經幼小針頭注射至眼球玻璃體內；
6. 注射後，評估病人視力；
7. 滴上抗生素眼藥水。

### 可能出現的風險及併發症

1. 感染
2. 視網膜脫落
3. 眼壓升高
4. 眼睛出現血塊或出血
5. 眼內發炎
6. 白內障
7. 心臟病發(罕見)
8. 中風(罕見)

\*\* 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。

## 注射前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行注射的原因、程序及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。請勿於面部或眼部塗搽面霜、眼霜、乳液或化妝品。
4. 注射前請先排清小便。

## 注射後須知

1. 可能會出現結膜下(眼白)出血或充血，但此情況會於一至兩星期內逐漸消退。
2. 注射後的一至兩天，注射位置可能會疼痛及有異物感。
3. 避免眼睛沾水。

## 出院後注意事項

1. 請按醫生指示使用抗生素眼藥水或眼藥膏。
2. 注射後的數天會出現紅眼及不適等徵狀，此乃正常現象。
3. 注射後的數天避免眼睛沾水或游泳。
4. 視乎療程需要，可能需於預約的時間內注射另一次的血管內皮生長因子抑制藥物。
5. 如眼睛的紅腫加劇、怕光、腫痛、視力模糊、寒顫、發熱(體溫高於 38°C 或 100.4°F)或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
6. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

---

---

---

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢  
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知