


手术资料

玻璃体注射血管内皮生长因子抑制药物

Intravitreal Injection of Anti-Vascular Endothelial Growth Factors Drug

简介

血管内皮生长因子(VEGF)是一种促进血管增生的蛋白质。临床上有很多眼科疾病都会引致血管增生，例如：老年性黄斑部病变及湿性老年黄斑病变，它们都是由于视网膜内出现不正常的血管增生，而增生的血管较脆弱，容易渗漏和出血，以致造成黄斑部水肿，从而令视力下降，甚至失明。



治疗效果

注射血管内皮生长因子抑制药物可阻止增生血管生长，从而减低血管渗漏和出血。患者一般需在指定时期内接受注射疗程，治疗效果显著，多数患者的视力都能得以改善。

注射过程

1. 患者需躺于手术椅或床上
2. 点麻醉眼药水进行局部麻醉
3. 用扩张器使眼睛保持睁开
4. 注射前先点麻醉及抗生素眼药水
5. 把药物注射至眼球玻璃体内
6. 注射后，评估患者视力
7. 点抗生素眼药水

可能出现的风险及并发症

1. 感染
2. 视网膜脱落
3. 眼压升高
4. 眼睛出现血块或出血
5. 眼内发炎
6. 白内障
7. 心脏病发(罕见)
8. 中风(罕见)

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论程序如何妥善，仍有出现并发症的风险。

注射前的准备

1. 医生会向患者解释施行注射的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
4. 注射前请先排清小便。

注射后须知

1. 可能会出现结膜下出血或充血，但此情况会于一至两星期内逐渐消退。
2. 注射后的一至两天，注射部位可能会疼痛及有异物感。
3. 避免眼睛沾水。

出院后注意事项

1. 按医生指示使用抗生素眼药水。
2. 注射后数天会出现红眼及不适等症状，此为正常现象。
3. 注射后数天避免眼睛沾水或游泳。
4. 视疗程需要，可能需于预约的时间内注射另一次的血管内皮生长因子抑制药物。
5. 如眼睛的红肿加剧、怕光、肿痛、视力模糊、寒颤、发烧(体温高于 38°C) 或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
6. 请按时复诊。

如您对此程序有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记住相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好!

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知