



手術資料

眼瞼下垂矯正術 **Correction of Ptosis** **(Drooping Eyelid)**

簡介

眼瞼下垂是上眼瞼眼肌無力，使之失去上抬的功能，可以發生於一邊眼睛或於雙眼同時發生。嚴重的眼瞼下垂可遮蓋部份或整個瞳孔，因而影響視力，甚至引致弱視。眼瞼下垂可由先天因素、疾病、創傷或衰老所引致。

藥物可能對部份後天眼瞼下垂的成人患者有治療功效。眼瞼下垂矯正術是一項外科手術用以修復下垂的眼瞼。對於部份成人患者來說，外觀因素可能是進行此手術的主因。然而，對先天患者來說，眼瞼下垂可帶來身、心及功能上的不良後果，及早的手術矯正至關重要。



適應症

因眼瞼下垂而引致視線受阻

治療成效

此手術的成效視乎眼瞼下垂原因而定。在普遍情況下，矯正手術可把下垂的眼瞼提起，以改善視力及外觀，於兒童方面則有助避免弱視形成。

手術過程

1. 麻醉
 - 絕大部份的手術可在局部麻醉下進行，亦可考慮配以藥物鎮靜。如沒有使用鎮靜藥物，術間病人會維持清醒。會使用局部麻醉藥滴眼，及注射局部麻醉藥到手術的部位。
 - 如病人未能合作--尤其兒科病人，則須要施行全身麻醉。
2. 兩個矯正方法
 - 提瞼肌切除
 - i. 開一切口在上眼瞼皮膚的縐摺位，或開在眼瞼內。
 - ii. 切除部份提瞼肌組織，並以縫線固定於眼瞼。
 - iii. 以縫線縫合切口。
 - 前額縫吊（當提瞼肌無力的情況較嚴重時使用）
 - i. 在前額、眼眉及眼皮開幾個小切口。
 - ii. 以人工物料（如矽線）或自體組織（從病人身體採集）連接提瞼肌及額肌。

可能出現的風險及併發症

1. 眼瞼瘀傷、腫脹及因縫線引致刺激：甚為常見，通常會逐漸消退
2. 感染：較罕見
3. 流血或血腫：不常見
4. 疤痕或肉芽腫：通常不易被察覺或會消退
5. 暴露性角膜病變：很常見，通常使用人工淚液及對眼睛作足夠保護便能使之消退
6. 角膜損傷、角膜潰瘍，甚至失明：非常罕見
7. 眼瞼不對稱、眼睛形態或睫毛方向轉變：甚為常見
8. 矯正過少：間中出現，但不會引致嚴重後果
9. 矯正過多：間中出現。嚴重的過度矯正可能會引致角膜受損並影響視力，必須採取措施保護角膜，並可能需要再次進行手術。
10. 復發：可能要再次接受手術治療
11. 若手術以前額縫吊的方法進行，如使用的是自體組織，供體部位有機會出現併發症，例如出血和感染；如使用的是人工物料，則有機會出現排斥及外露，在這種情況下，縫吊必須移除。

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善，仍有出現併發症的風險。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術治療這些併發症。

手術前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行手術的原因、程序及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 如手術以全身麻醉進行，可能需進行術前常規檢查，如血液測試、心電圖和 X 光檢查等。
4. 手術當天切勿於面部或眼部塗搽面霜、眼霜、乳液或化妝品。
5. 病人不宜親自駕駛前來。由於術後可能要將眼部遮蓋，視覺空間感知會受影響，病人宜由家人陪伴前來進行手術。
6. 如手術以全身麻醉進行，術前 6 小時禁止飲食。
7. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
8. 手術前請先排清小便。

手術後須知

一般情況

1. 全身麻醉後，病人可能會：
 - 因麻醉時曾插喉而引致喉部輕微不適或疼痛；
 - 出現麻醉藥的副作用，包括疲倦、渴睡、噁心或嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。
2. 如傷口感到疼痛，可通知護士，護士會按醫生指示為病人注射止痛針或提供口服止痛藥。

傷口及眼睛護理

1. 如患處有敷料或眼罩，切勿自行移除。
2. 依醫生處方滴眼藥水及使用眼藥膏，以預防傷口感染。
 - 使用眼藥前，先清潔眼睛（當眼有分泌物時，以同樣方法清理）
 - i. 用肥皂徹底清洗雙手。
 - ii. 將清潔的化妝棉以涼開水沾濕。
 - iii. 閉上眼睛。
 - iv. 用化妝棉由內眼角往外眼角輕力抹拭。
 - v. 丟棄化妝棉，每片化妝棉只可使用一次。

- vi. 用新的化妝棉，重複 ii 至 v，直到眼睛清潔為止。
- 滴眼藥水/藥膏到下眼瞼內 (除非醫生有特別指示)
 - i. 頭向後傾，眼望上方。
 - ii. 將下眼瞼向下和向外拉，使之形成小袋般用以盛載眼藥。
 - iii. 將藥瓶嘴放於下眼瞼之上。切勿讓手或眼睛接觸到瓶嘴。
 - iv. 輕力擠壓藥瓶，使藥物落入眼瞼袋中。
 - 滴眼藥水/藥膏後
 - i. 閉上眼睛，切勿眨眼。
 - ii. 如果剛滴的是眼藥水，輕按壓內眼角與鼻子交匯的皮膚一分鐘。按壓的位置是淚管的通道。這按壓動作讓藥水有時間被眼睛吸收，而非直接流入喉嚨。
 - 如需同時使用多於一種眼藥，在使用不同眼藥之間須相隔三分鐘。
 - 如需同時使用眼藥水和眼藥膏，請先使用眼藥水。
3. 保持傷口及雙眼清潔。縫線 (如有) 會於一星期內拆除。
 4. 用消毒紗布遮蓋眼部作保護，每日最少更換蓋眼紗布一次。
 5. 切勿揉眼或讓眼睛受壓。
 6. 術後一星期內，切勿讓水或異物觸及眼睛。如需洗髮，可找別人協助，或使用免沖水洗髮帽。
 7. 傷口痊癒前，避免於眼部化妝。
 8. 遠離塵土飛揚的環境，避免刺激眼睛。
 9. 避免穿着過頭穿之衣服，以免在更衣時衣服觸及眼睛引致痛楚和感染。

活動

1. 病人可做輕巧的家務及運動。
2. 在得到醫生允許前，切勿駕駛、操作機械、游水、進行劇烈或競技活動。
3. 術後初期你未必能適應敷料遮蓋著眼睛，建議夜間亮燈以防跌倒或受傷。

飲食

待麻醉藥效消退後，便可逐漸恢復正常飲食。

出院後注意事項

1. 請遵照醫生指示服用藥物。謹記依照指示使用眼藥水及眼藥膏。
2. 術後首星期，眼瞼出現腫脹和瘀傷乃正常現象。
3. 如有以下情況請即聯絡主診醫生或回院診治：進行手術的眼睛大量出血、劇痛、紅腫增加、膿液流出、視力模糊、寒顫、發熱(體溫高達38°C或100°F以上) 或其他異常情況。
4. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

