

## 手術資料

### 眼瞼及眼周邊腫瘤切除手術 (Excision of Eyelid & Ocular Tumor)

#### 簡介

眼瞼及眼周邊腫瘤是一種較常見之眼疾，一般可分為良性及惡性兩種。眼瞼腫瘤有數個類型，最常見的是痣和乳頭瘤。惡性眼瞼腫瘤包括基底細胞癌，皮脂腺癌，鱗狀細胞癌和黑色素瘤。

視乎病人情況，醫生可能會建議進行手術以切除腫瘤。請與主診醫生商討以決定最佳的治療方案。

#### 治療成效

此程序可切除患眼的眼瞼腫瘤，有效預防或減低腫瘤再次復發，受感染和惡化的機會。

#### 手術過程

1. 此手術可在局部或全身麻醉下進行；
2. 範圍較大的腫瘤，需要將眼瞼帶放鬆或借助同一邊之另一眼皮，重新整合眼周邊組織；
3. 因此有機會需要借助眼周邊之組織、另一邊眼皮之組織或由身體其他部份取皮作植皮手術；
4. 患眼傷口會用眼墊覆蓋。

#### 可能出現的風險及併發症

1. 傷口感染化膿
2. 傷口併裂或未能愈合
3. 形成癍痕、痂及疤
4. 未能完全切除腫瘤
5. 腫瘤重生、增大或擴散
6. 因腫瘤過大而未能重整眼瞼、眼周邊或面部
7. 眼瞼下垂、退縮或眼瞼及眼周邊變形
8. 因縫線或眼皮痂而引致眼部不適、角膜磨損等
9. 因結痂而引致眼球及眼皮互相黏連而導致複視
10. 腫瘤或手術所引起的疼痛/壓力可能會對身體有不良影響
11. 可能需要再次進行手術

\*\* 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善，仍有發生併發症的風險。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術治療這些併發症。

## 手術前的預備

1. 保持個人衛生可預防外科傷口感染。有見於此，院方建議病人於手術當日清洗身體及頭髮。
2. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、程序及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。如正服用影響血液凝固的藥物，例如阿士匹靈(Aspirin)、華法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或 Pradaxa(百達生)或非類固醇抗炎藥，例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中藥，請儘早通知醫生。
4. 術前 6 小時禁止飲食。(只適用於全身麻醉)
5. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。請勿於面部或眼部塗搽面霜、眼霜、乳液或化妝品。
6. 手術前請先排清小便。

## 手術後須知

### 一般情況

1. 全身麻醉後，病人可能會：
  - 因麻醉時曾插喉而引致喉部輕微不適或疼痛；
  - 出現麻醉藥的副作用，包括疲倦、渴睡、噁心或嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。

### 傷口護理

1. 傷口會用眼墊覆蓋，請保持傷口清潔及乾爽。
2. 請勿揉眼。

### 飲食

1. 待麻醉藥效消退後，便可按指示恢復正常飲食。

### 活動

1. 請按照醫生指示，避免揉眼、進行劇烈運動或游泳。

## 出院後注意事項

1. 如屬惡性腫瘤，病人可能需要接受電療或化療、定期覆診或被轉介往其他專科如內科、外科或腫瘤科等。
2. 保持良好的個人衛生可減低感染的風險，尤其是眼部和手部衛生。
3. 短期內，請避免進行眼部化妝及佩戴隱形眼鏡，詳情請向醫生查詢。
4. 如手術部位劇痛、出血或分泌大量淚水或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
5. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

---

---

---

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢  
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

