

手术资料

眼睑及眼周边肿瘤切除手术 (Excision of Eyelid & Ocular Tumor)

简介

眼睑及眼周边肿瘤是一种较常见的眼疾，一般可分为良性及恶性。眼睑肿瘤有数个类型，最常见的是痣和乳头瘤。恶性眼睑肿瘤包括基底细胞癌，皮脂腺癌，鳞状细胞癌和黑色素瘤。

视个人情况，医生可能会建议手术切除肿瘤。请与主诊医生商讨决定最佳的治疗方案。

治疗效果

切除患眼的眼睑肿瘤，有效预防或减低肿瘤再次复发、受感染和恶化。

手术过程

1. 可在局部或全身麻醉下进行；
2. 范围较大的肿瘤，需要将眼睑带放松或借助同一侧另一眼皮，重新整合眼周边组织；
3. 有可能需要借助眼周边组织、另一侧眼皮组织或由身体其他部位取皮作植皮手术；
4. 患眼伤口会用眼垫覆盖。

可能出现的风险及并发症

1. 刀口感染化脓
2. 刀口裂开或未能愈合
3. 形成瘢痕、痂及疤
4. 未能完全切除肿瘤
5. 肿瘤重生、增大或扩散
6. 因肿瘤过大而不能重整眼睑、眼周边或面部
7. 眼睑下垂、退缩或眼睑及眼周边变形
8. 因缝线或眼皮痂而引致眼部不适、角膜磨损等
9. 因结痂而引致眼球及眼皮互相沾连而导致复视
10. 肿瘤或手术所引起的疼痛/压力可能会对身体有不良影响
11. 可能需要再次手术

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防刀口感染。患者于手术当天务必洗澡及洗头。
2. 医生会向患者解释做手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或 Pradaxa(百达生)或非类固醇抗炎药，例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中药，请尽早通知医生。
4. 术前6小时禁止饮食(只适用于全身麻醉)。
5. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。请勿于面部或眼部擦面霜、眼霜、乳液或化妆品。
6. 手术前请先排清小便。

手术后须知

一般情况

1. 全身麻醉后，患者可能会：
 - 因麻醉时曾插管而引致喉部轻微不适或疼痛；
 - 出现麻醉药的副作用，包括疲倦、渴睡、恶心或呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。

刀口护理

1. 刀口会用眼垫覆盖，请保持刀口清洁干燥。
2. 请勿揉眼。

饮食

1. 待麻醉药作用消退后，便可按指示恢复正常饮食。

活动

1. 请按照医生指示，勿揉眼、勿做剧烈运动或游泳。

出院后注意事项

1. 如属恶性肿瘤，患者可能需要接受放疗或化疗、定期复诊或被转介往其他专科如内科、外科或肿瘤科等。
2. 保持良好的个人卫生可减少感染的风险，尤其是眼部和手部卫生。
3. 短期内，请勿进行眼部化妆及佩戴隐形眼镜，详情请向医生查询。
4. 如手术部位剧痛、出血或分泌大量泪水或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
5. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信你会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

