



## 手术资料

# 眼睑及眼周边肿瘤切除手术 Excision of Eyelid & Ocular Tumor

### 简介

眼睑及眼周边肿瘤是一种较常见的眼疾，一般可分为良性及恶性两种。眼睑肿瘤有数种类型，最常见的是痣和乳头瘤。恶性眼睑肿瘤包括基底细胞癌，皮脂腺癌，鳞状细胞癌和黑色素瘤。

根据患者情况，医生可能会建议手术切除肿瘤。请与主诊医生商讨决定最佳的治疗方案。

### 治疗效果

此手术可切除患眼的眼睑肿瘤，有效预防或减低肿瘤再次复发、受感染和恶化。

### 手术过程

1. 手术可在局部或全身麻醉下进行；
2. 范围较大的肿瘤，需要将眼睑带放松或借助同一侧的另一眼皮，重新整合眼周边组织；
3. 有可能需要借助眼周边组织、另一侧眼皮组织或身体其他部位取皮作植皮手术；
4. 患眼刀口会用眼垫覆盖。

### 可能出现的风险及并发症

1. 刀口感染化脓
2. 刀口裂开或未能愈合
3. 刀口形成瘢痕、痂及疤
4. 未能完全切除肿瘤
5. 肿瘤重生、增大或扩散
6. 因肿瘤过大而未能重整眼睑、眼周边或面部
7. 眼睑下垂、退缩或眼睑及眼周边变形
8. 因缝线或眼皮痂而引致眼部不适、角膜磨损等
9. 因结痂而引致眼球及眼皮互相黏连而导致复视
10. 肿瘤或手术所引起的疼痛或压力可能会对身体有不良影响
11. 可能需要再次手术

\*\* 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。  
如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

## 手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防刀口感染。患者于手术当天务必洗澡及洗头。
2. 医生会向患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百达生(Pradaxa)或非类固醇抗炎药，例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中药，请尽早通知医生。
4. 术前6小时禁止饮食(只适用于全身麻醉)。
5. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。请勿在面部或眼部涂面霜、眼霜、乳液或化妆品。
6. 手术前请先排清小便。

## 手术后须知

### 一般情况

1. 全身麻醉后，患者可能会：
  - 因麻醉时曾插管而引致喉部轻微不适或疼痛；
  - 出现麻醉药的副作用，包括疲倦、渴睡、恶心或呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。

### 刀口护理

1. 手术部位会盖上眼垫以保护患眼，请保持刀口清洁干燥。
2. 睡觉时应使用眼罩，防止患眼受到磨擦或碰撞。
3. 为免更衣时衣服触及眼睛引致发炎，建议穿开身衣服。
4. 请勿揉患眼。

### 饮食

1. 麻醉药作用消退后，便可按指示恢复正常饮食。

### 活动

1. 首星期内，请勿洗头。
2. 两星期内，可如常淋浴，但请避免患眼沾水。
3. 请勿做剧烈运动和提取重物。

## 出院后注意事项

1. 如属恶性肿瘤，患者可能需要接受放疗或化疗、定期复诊或被转介往其他专科如内科、外科或肿瘤科等。
2. 保持良好的个人卫生可减低感染的风险，尤其是眼部和手部卫生。
3. 短期内，请避免眼部化妆及佩戴隐形眼镜，详情请向医生查询。
4. 建议夜间去卫生间时开灯以防摔倒。
5. 请避免患眼沾水、皂液或洗发精。
6. 请勿做剧烈运动和提取重物，直至获医生同意恢复正常活动为止。
7. 如感到视力突然模糊、刀口部位大量出血、发红、肿胀、疼痛加剧、有大量分泌物、寒颤、发烧(体温高达38°C或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
8. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

---

---

---

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询  
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

