



程序資料


倒睫治療

Surgical Correction of Trichiasis (Ingrowing Eyelashes)

簡介

倒睫是指睫毛向內生長而刺激眼球，可能導致眼部出現紅腫、疼痛及淚水汪汪，視力亦會因此變得模糊。若倒睫處理不當，可能會導致角膜感染、結痂，甚至失明。倒睫的成因有很多，可能是眼部曾被灼傷或由手術引致受損。

人造淚液、拔除倒睫及激光治療可緩解輕微的不適，若要徹底根治便需透過手術永久切除倒睫。請與主診醫生商討決定最佳的治療方案。



治療成效

此程序可切除倒睫，亦有助於預防與倒睫有關的眼部感染。若睫毛在同一位置重新生長，便可能需要接受跟進治療。

程序過程

1. 此程序會在局部麻醉下進行；
2. 利用含碘消毒液清洗眼瞼；
3. 醫生可利用顯微鏡或放大鏡來尋找倒睫；
4. 將倒插睫毛的毛囊根部用電燒的方式破壞；
5. 於眼部塗上抗生素軟膏；
6. 患眼傷口會用眼墊覆蓋。

可能出現的風險及併發症

1. 倒睫復發、重生或情況惡化
2. 結痂或感染
3. 情況未能改善或過度修正
4. 角膜受損
5. 激光或電流引起之併發症如灼傷、失明等

** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有發生併發症的風險。如附近器官受損、程序後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術治療這些併發症。

程序前的預備

1. 保持個人衛生可預防感染。
2. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、程序及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。如正服用影響血液凝固的藥物，例如阿士匹靈(Aspirin)、華法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百達生(Pradaxa)或非類固醇抗炎藥，例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中藥，請儘早通知醫生。
4. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。請勿於面部或眼部塗搽面霜、眼霜、乳液或化妝品。
5. 程序前請先排清小便。

程序後須知及出院後注意事項

1. 眼部徹底消腫需時數天。
2. 請按照醫生指示使用抗生素。
3. 保持良好的個人衛生可減低感染的風險，尤其是眼部和手部衛生。
4. 如眼睛劇痛或視力模糊或其他異常情況，請即聯絡主診醫生或回院診治。
5. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知