



程序資料

淚管沖洗/探通術 Syringing / Probing of Tear Duct

簡介

淚眼是由於淚管阻塞或狹窄而造成，淚管阻塞或狹窄是嬰兒最常見的疾病，但隨著嬰兒逐漸長大，此疾病通常會不藥而癒。倘若嬰兒在6-8個月大後仍分泌大量淚水，因而引致嚴重感染或重複感染，便應接受淚管沖洗/探通術以清除阻塞。

治療成效

此程序可有效改善淚眼情況。

過程

1. 此程序可在全身或局部麻醉下進行；
2. 把一條小而鈍的金屬探針緩緩地沿淚管放入以開通阻塞之淚道，再以無菌生理鹽水沖洗淚管至鼻腔；
3. 接受此程序後可能會感到輕微眼部不適。

可能出現的風險及併發症

1. 眼瞼瘀傷
2. 鼻腔出血
3. 疼痛
4. 粘連
5. 未能成功清除阻塞，可能需要重複進行另一治療程序

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。

程序前的預備

1. 保持個人衛生可預防外科傷口感染。有見於此，院方建議病人於接受治療程序當日清洗身體及頭髮。
2. 醫生會向父母/監護人/病人解釋施行治療程序的原因、過程及可能出現之併發症，父母/監護人/病人明白後便可簽署同意書。
3. 接受程序前6小時禁止飲食。(只適用於全身麻醉)

程序後須知

1. 全身麻醉後，病人可能會：
 - 因麻醉時曾插喉而引致喉部輕微不適或疼痛；
 - 出現麻醉藥的副作用，包括疲倦、渴睡、噁心或嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。
2. 如有需要，可服食醫生處方之止痛及止嘔藥。
3. 麻醉藥效過後便可按指示恢復正常飲食。
4. 恢復正常飲食後便可出院。

出院後注意事項

1. 保持手部衛生，依照指示正確使用眼藥水。
2. 使用眼藥水前後必須徹底清潔雙手。
3. 以棉花球沾濕暖開水清潔眼瞼。
4. 洗澡及洗頭時應小心避免污水流入眼內。
5. 父母/監護人應為嬰兒戴上手套，以免雙手觸碰眼睛而引致感染。
6. 避免揉眼睛。
7. 如感到眼睛疼痛及紅腫、出現大量分泌物、寒顫、發熱(體溫高達 38°C 或 100.4°F 以上) 或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
8. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知