



## 手术资料

# 泪管冲洗/探通术 Syringing / Probing of Tear Duct

### 简介

泪眼是由于泪管阻塞或狭窄而造成，泪管阻塞或狭窄是婴儿最常见的疾病，但随着婴儿逐渐长大，此疾病通常会不药而愈。倘若婴儿在6-8个月后仍分泌大量泪水，从而引致严重感染或重复感染，便应接受泪管冲洗/探通术清除阻塞。

### 治疗效果

可有效改善泪眼情况。

### 过程

1. 可在全身或局部麻醉下进行；
2. 把一条小而钝的金属探针缓缓地沿泪管放入开通阻塞的泪道，再用无菌生理盐水冲洗泪管至鼻腔；
3. 接受此手术后可能会感到轻微眼部不适。

### 可能出现的风险及并发症

1. 眼睑瘀伤
2. 鼻腔出血
3. 疼痛
4. 粘连
5. 未能成功清除阻塞，可能需要重复进行另一治疗程序

\*\* 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。

### 手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防伤口感染。患者于手术当天务必洗澡及洗头。
2. 医生会向父母/监护人/患者解释做手术的原因、过程及可能出现之并发症，父母/监护人/患者明白后便须签署同意书。
3. 手术前6小时禁止饮食（只适用于全身麻醉）。

### 手术后须知

1. 全身麻醉后，患者可能会：
  - 因麻醉时曾插管而引致喉部轻微不适或疼痛；
  - 出现麻醉药的副作用，包括疲倦、渴睡、恶心或呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。
2. 如有需要，可服医生处方之止痛及止吐药。
3. 麻醉药作用过后便可按指示恢复正常饮食。
4. 恢复正常饮食后便可出院。

## 出院后注意事项

1. 保持手部卫生，按指示正确使用眼药水。
2. 使用眼药水前后必须彻底洗手。
3. 用棉花球沾湿温开水清洗眼睑。
4. 洗澡及洗头时应小心避免污水流入眼内。
5. 父母/监护人应为婴儿戴上手套，以免双手触碰眼睛而引致感染。
6. 请勿揉眼睛。
7. 如感到眼睛疼痛及红肿、出现大量分泌物、寒颤、发烫(体温高达 38°C 或以上) 或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
8. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

---

---

---

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询  
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知