



## 程序資料

# 眼結石摘除術 Removal of Ocular Lithiasis

### 簡介

眼結石是位於結膜上白色或黃色顆粒狀的「結石」。它可能長於上或下眼蓋。大部分病人並無症狀。有些常見的症狀包括眼部不適、眼內感覺有異物刺激。若病人並無症狀，通常不需要進行介入治療。若眼瞼組織有損傷風險及出現角膜糜爛症狀，便可選擇利用手術針摘除眼結石。

### 治療成效

眼結石摘除術可緩解患眼不適，預防進一步併發症及改善眼部外觀。

### 程序過程

1. 此程序會在局部麻醉下進行；
2. 醫生用蘸有麻醉藥的棉簽塗抹患處；
3. 使用小型皮下注射針摘除小結石。

### 可能出現的風險及併發症

1. 傷口出血
2. 傷口感染
3. 角膜糜爛
4. 角膜損傷

\*\* 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善，仍有發生併發症的風險。

### 程序前的預備

1. 保持個人衛生可預防外科傷口感染。有見於此，院方建議病人於程序當日清洗身體及頭髮。
2. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、程序及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。如正服用影響血液凝固的藥物，例如阿士匹靈(Aspirin)、華法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百達生(Pradaxa)及中藥，請儘早通知醫生。
4. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。請勿於面部或眼部塗搽面霜、眼霜、乳液或化妝品。(如適用)
5. 程序前請先排清小便。

## 程序後須知

除去結石後，首 24 - 48 小時可按醫生指示使用含抗生素及類固醇眼藥水(例如：TobraDex ST, Alcon)，有助減少眼部發炎的機會及預防患眼的繼發性感染。

## 出院後注意事項

1. 請按照醫生指示服用藥物。
2. 請保持傷口清潔及乾燥。
3. 保持良好的個人衛生可減低感染的風險，尤其是眼部和手部衛生。
4. 請勿揉擦患眼。
5. 如眼部出現嚴重疼痛、發紅、腫脹、觸痛、分泌膿液、寒顫、發熱(體溫高達 38°C 或 100.4°F 以上) 或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
6. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

---

---

---

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢  
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知