

手术资料

眼结石摘除术 Removal of Ocular Lithiasis

简介

眼结石是位于结膜上白色或黄色颗粒状的「结石」。它可能长于上或下眼盖。大部分患者并无症状。有些常见的症状包括眼部不适、眼内感觉有异物刺激。若患者并无症状，通常不需要进行介入治疗。若眼睑组织有损伤风险及出现角膜糜烂，便可选择手术针摘除眼结石。

治疗效果

眼结石摘除术可缓解患眼不适，预防进一步并发症及改善眼部外观。

手术过程

1. 在局部麻醉下进行；
2. 医生用蘸有麻醉药的棉签擦患处；
3. 用小型皮下注射针摘除小结石。

可能出现的风险及并发症

1. 伤口出血
2. 伤口感染
3. 角膜糜烂
4. 角膜损伤

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。

手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防感染。患者于手术当天务必洗澡及洗头。
2. 医生会向患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或 Pradaxa(百达生)及中药，请尽早通知医生。
4. 请除去隐形眼镜(如有)及身上衣物，换上手术衣(如适用)。
5. 术前请先排清小便。

手术后须知

摘除结石后，首 24-48 小时可按医生指示使用含抗生素及类固醇的眼药水(例如：TobraDex ST, Alcon)，有助减少眼部发炎的可能及预防患眼的继发性感染。

出院后注意事项

1. 请遵照医生指示服用药物。
2. 请保持伤口清洁干燥。请勿揉患眼并保持良好的手部卫生。
3. 如眼部出现严重疼痛、发红、肿胀、触痛、分泌脓液、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或 100°F 以上) 或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
4. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知