

手術資料


刮宮

Dilatation and Curettage of Uterus (D&C)

簡介

本手術是從子宮內取出內膜組織。

適應症：移除流產後的組織 / 治療大量月經出血或月經失調 / 進行治療性或人工性流產



手術過程

1. 手術會在全身麻醉下進行
2. 醫生將子宮頸逐漸擴張
3. 取出子宮內的組織

可能出現的風險及併發症

1. 感染
2. 出血
3. 子宮頸撕裂
4. 子宮內膜粘連
5. 刺穿子宮

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善，仍有出現併發症的風險。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術治療這些併發症。

手術前的預備

1. 醫生會向病人解釋手術原因、程序及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 於**手術前 6 小時**開始禁食及飲水。
3. 脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
4. 手術前先排清小便。

手術後須知

一般情況

1. 病人可能因全身麻醉時喉部插管而引致喉部輕微不適或疼痛。
2. 全身麻醉後，病人可能會感到疲倦、渴睡、噁心、甚至嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。
3. 如陰道大量出血、感到腹脹或腹痛(盆腔絞痛)，請通知護士跟進。
4. 如有需要，醫生會處方止痛藥。

飲食

在一般情況下，待麻醉藥效消退後，可恢復正常飲食，毋需戒口。

活動

1. 如病人進展良好，可於手術後當天恢復正常活動。
2. 陰道出血、盆腔絞痛及背痛通常會於手術後數天減退。

出院後注意事項

1. 病人一般可在手術當天出院。
2. 手術後的兩週內或仍有陰道出血時，不建議使用月經棉條及進行性交。
3. 如陰道大量出血、腹痛(盆腔絞痛)加劇、發熱(體溫 38°C 或 100°F 以上)或不適，請即聯絡主診醫生或回院診治。
4. 請於指定的日期、時間及地點覆診。

備註: 如有任何查詢，請聯絡主診醫生。

參考資料

D and C. (06 June 2010). *MedlinePlus*. 取自 <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002914.htm>.

