



## 手術資料

# 終止懷孕 Termination of Pregnancy


### 適應症

狀態性焦慮 / 胎兒異常 / 妊娠合併疾病

### 治療成效

此手術於以下情況有幫助：

1. 若懷孕對孕婦生命、生理或心理健康所構成的危險較終止懷孕的大。
2. 若嬰兒出生後將會因為身體或心理不正常導致嚴重殘疾。



### 手術過程

1. 軟化子宮頸(如有需要)；
2. 手術通常在全身麻醉下進行，如選擇其他麻醉方式，請與醫生商討；
3. 擴張子宮頸(如有需要)；
4. 插入吸管；
5. 以負壓抽吸子宮內含物。

### 可能出現的風險及併發症

1. 大量出血(0.1%)，可能需要輸血。
2. 子宮頸撕裂(1%)。
3. 子宮穿孔(0.1 – 0.4%)。
4. 宮腔粘連。
5. 宮頸內口鬆弛。
6. 未能成功終止妊娠或不完全流產。
7. 妊娠物殘留而導致出血或感染，需另外進行刮宮手術。
8. 盆腔感染(1%)及影響生育。
9. 附近器官受損而需施行腹腔鏡或開腹探查或修補。
10. 將來可能出現第三產程併發症。
11. 不良的心理影響。

\*\* 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善，仍有出現併發症的風險。如附近器官受損或手術後嚴重出血時，可能需要進行另一手術治療這些併發症。

## 手術前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行手術的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 手術前一晚須沐浴及洗髮，注意會陰部位的清潔。
4. 術前6小時禁止飲食。
5. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
6. 手術前請先排清小便。

## 手術後須知

1. 全身麻醉後，病人可能會：
  - 因麻醉時曾插喉而引致喉部輕微不適或疼痛；
  - 出現麻醉藥的副作用，包括疲倦、渴睡、噁心或嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。
2. 請卧床休息2至3小時。
3. 休息後可飲用少量清水，及後若無嘔吐，便可進食容易消化的食物，如粥、三文治及通粉等(特別指示除外)。
4. 病人必須完全清醒、能進食、排尿正常及沒有感到不適，方可離院(特別指示除外)。

## 出院後注意事項

1. 手術後數天應多休息。
2. 手術後數天請避免飲用含酒精之飲品及進食中藥，如當歸、人蔘、田七及鹿茸等。
3. 保持個人衛生，淋浴為佳。
4. 請於二星期後或指定日期、時間及地點覆診。
5. 手術後跟進：避孕(請與醫生商討)。

## 其他治療方法

1. 藥物引產。
2. 繼續懷孕及可以尋求出生權益會或母親的抉擇支援。

如病人對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

---

---

---

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢  
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

