



## 手術資料

### 子宮頸息肉切除術 Cervical Polypectomy

#### 簡介

子宮頸息肉是生長於宮頸的細小組織，其外表光滑，顏色偏紅或紫，形狀如水滴。息肉生長於子宮頸的表面或子宮頸管內。息肉通常屬良性(非癌症)，可單一或成群生長。子宮頸息肉切除術是一項外科治療用以切除息肉。如有需要，息肉可能需作活組織檢驗。

#### 治療成效

此手術可切除子宮頸息肉，從而減低不正常陰道出血及分泌。

#### 手術過程

1. 手術會在沒有麻醉下進行(如息肉較大及於子宮深入位置，便建議進行全身麻醉)；
2. 經陰道放入窺器以現出宮頸；
3. 清潔宮頸；
4. 切除息肉；
5. 所有取出的組織會送往化驗或依慣常程序處理。

#### 可能出現的風險及併發症

1. 感染
2. 出血
3. 息肉復發

\*\* 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善，仍有出現併發症的風險。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行輸血或另一手術治療這些併發症。

## 手術前的預備

1. 保持個人衛生可預防感染。
2. 醫生會向病人解釋施行手術的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
4. 術前6小時禁止飲食。(只適用於全身麻醉)
5. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。(只適用於全身麻醉)
6. 手術前請先排清小便。(只適用於全身麻醉)

## 手術後須知

### 一般情況

1. 全身麻醉後，病人可能會：
  - 因麻醉時曾插喉而引致喉部輕微不適或疼痛；
  - 出現麻醉藥的副作用，包括疲倦、渴睡、噁心或嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。

### 傷口護理

1. 手術後數小時內，病人可能會感到子宮攣痛。
2. 陰道滲血及分泌可長達7天，此乃正常現象。

### 飲食

待麻醉藥效消退後，便可逐漸恢復正常飲食。

## 出院後注意事項

1. 請遵照醫生指示服用藥物。
2. 數週內可能有輕微陰道出血及分泌物流出，請使用衛生棉墊(非衛生棉條)保持清潔。
3. 請避免性生活直至陰道分泌物停止。
4. 手術後可如常洗澡，請勿浸浴直至陰道分泌物停止。
5. 如陰道持續出血或流出分泌物、持續盆腔疼痛、寒顫、發熱(體溫高於38°C或100.4°F)或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
6. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

---

---

---

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢  
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

