



手术资料

子宫颈息肉切除术 Cervical Polypectomy

简介

子宫颈息肉是生长在宫颈的小组织，其外表光滑，颜色偏红或紫，形状如水滴。息肉生长在子宫颈的表面或子宫颈管内。息肉通常属良性(非癌症)，可单一或成群生长。子宫颈息肉切除术可将息肉切除，如有需要，息肉可能需作活组织检验。

治疗成效

切除子宫颈息肉，从而减低不正常阴道出血及分泌。

手术过程

1. 手术在没有麻醉下进行(如息肉较大或在子宫较深入的位置，则建议进行全身麻醉)；
2. 经阴道放入窥器现出宫颈；
3. 清洁宫颈；
4. 切除息肉；
5. 所有取出的组织送往检验或依惯常程序处理。

可能出现的风险及并发症

1. 感染
2. 出血
3. 息肉复发

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要进行输血或另一手术治疗这些并发症。

手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防感染。
2. 医生会向患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
4. 术前6小时禁止饮食(只适用于全身麻醉)。
5. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等，换上手术衣(只适用于全身麻醉))。
6. 手术前请先排清小便(只适用于全身麻醉)。

手术后须知

一般情况

1. 全身麻醉后，患者可能会:
 - 因麻醉时曾插管而引致喉部轻微不适或疼痛；
 - 出现麻醉药的副作用，包括疲倦、渴睡、恶心或呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。

伤口护理

1. 手术后数小时内，患者可能会感到子宫挛痛。
2. 阴道渗血及分泌可长达7天，此为正常现象。

饮食

麻醉药作用消退后，便可逐渐恢复正常饮食。

出院后注意事项

1. 请遵照医生指示服药。
2. 数周内可能会有轻微阴道出血及分泌物，请使用卫生棉垫(非卫生棉条)保持清洁。
3. 请避免性生活直至阴道分泌物停止。
4. 手术后可如常洗澡，请勿浸浴直至阴道分泌物停止。
5. 如阴道持续出血或流出分泌物、持续盆腔疼痛、寒颤、发烧(体温高于38°C)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
6. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复，并祝生活愉快！

若您阅读此章程后有任何查询，请记住相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

