



手術資料

陰道鏡檢查 ± 活檢 Colposcopy ± Biopsy

簡介

陰道鏡檢查可用作婦科外科檢查及治療宮頸病變，醫生會利用特殊儀器(陰道鏡)檢驗子宮頸、陰道和外陰。此檢查可用作診斷生殖道的內在問題。如婦女出現子宮頸癌徵狀，或子宮頸抹片化驗結果不正常，醫生便會建議進行陰道鏡檢查。如有需要，醫生會抽取活檢樣本作進一步診斷和病理檢驗。

治療成效

透過陰道鏡檢查可仔細地觀察生殖道異常組織病變情況，並切除組織送往化驗。活檢可幫助醫生診斷及確定上皮內瘤或癌前期的等級(子宮頸上皮內瘤/陰道上皮內瘤/外陰上皮內瘤)，從而為病人決定合適的治療方案。

手術過程

1. 經陰道放入窺器以現出生殖道；
2. 用棉球沾上醋酸塗擦生殖道部位；
3. 找出異常組織；
4. 切除一小塊組織；
5. 所有取出的組織可能會送往化驗。

可能出現的風險及併發症

1. 感染
2. 出血
3. 如懷孕，可能會有流產風險

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善，仍有出現併發症的風險。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行輸血或另一手術治療這些併發症。

手術前的預備

1. 保持個人衛生可預防感染。
2. 醫生會向病人解釋施行手術的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
3. 如病人正在或懷疑懷孕，請告知醫生。
4. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
5. 手術前 24 小時開始請勿進行性行為、使用陰道藥物、潤滑劑、乳膏或棉條。
6. 視乎活檢類型，病人可能需要進行局部或全身麻醉。請與醫生商討並決定合適的活檢類型。
7. 術前6小時禁止飲食。(只適用於全身麻醉)
8. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
9. 手術前請先排清小便。

手術後須知

一般情況

1. 全身麻醉後，病人可能會：
 - 因麻醉時曾插喉而引致喉部輕微不適或疼痛；
 - 出現麻醉藥的副作用，包括疲倦、渴睡、噁心或嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。
2. 如傷口感到疼痛，可通知護士，護士會按醫生指示為病人注射止痛針或提供口服止痛藥。

傷口護理

1. 手術後可能會有陰道分泌及/或出血。
2. 手術後首 1-2 天，病人的陰道可能會感到酸痛。
3. 如進行了宮頸錐形切除術，或會有紗布放於陰道內幫助止血，其後會由醫生取出紗布。

出院後注意事項

1. 數週內可能會有輕微陰道出血及分泌物流出，請使用衛生棉墊(非衛生棉條)保持清潔。
2. 四星期後可恢復性生活。
3. 手術後可如常洗澡，請勿浸浴直至分泌物完全停止。
4. 術後兩星期內或仍有分泌物流出時，請勿進行游泳活動。
5. 活檢結果需等待約四星期。
6. 如陰道持續出血或流出惡臭分泌物、盆腔及腹部疼痛、寒顫、發熱(體溫高於 38°C 或 100.4°F) 或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
7. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

