



## 手术资料

### 阴道镜检查 ± 活检 Colposcopy ± Biopsy

#### 简介

阴道镜检查可用于妇科检查及治疗宫颈病变。医生使用阴道镜检查子宫颈、阴道和外阴，可诊断生殖系统的问题。如出现子宫颈癌的症状，或子宫颈抹片化验结果不正常，医生便会建议进行阴道镜检查。如有需要，会取标本活检，作进一步诊断和病理学检验。

#### 治疗效果

透过阴道镜检查可仔细观察生殖系统异常组织的病变情况，并切除组织活检。活检可帮助医生诊断及确定上皮内瘤或癌前期的等级(子宫颈上皮内瘤/阴道上皮内瘤/外阴上皮内瘤)，从而决定合适的治疗方案。

#### 手术过程

1. 经阴道放入窥器；
2. 用棉球沾上醋酸擦生殖道；
3. 找出异常组织；
4. 切除一小块组织；
5. 所有取出的组织可能会送去检验。

#### 可能出现的风险及并发症

1. 感染
2. 出血
3. 如怀孕，可能会有流产风险

\*\* 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要输血或另一手术治疗这些并发症。

## 手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防感染。
2. 医生会向患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 如患者正在或怀疑怀孕，请告知医生。
4. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
5. 手术前 24 小时开始请勿有性行为、使用阴道药物、润滑剂、乳膏或棉条。
6. 根据活检类型，患者可能需要进行局部或全身麻醉。请与医生商讨并决定合适的活检类型。
7. 术前6小时禁止饮食（只适用于全身麻醉）。
8. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
9. 手术前请先排清小便。

## 手术后须知

### 一般情况

1. 全身麻醉后，患者可能会：
  - 因麻醉时曾插管而引致喉部轻微不适或疼痛；
  - 出现麻醉药的副作用，包括疲倦、渴睡、恶心或呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。
2. 如伤口部位疼痛，可通知护士，护士会按医生指示注射止痛针或提供口服止痛药。

### 伤口护理

1. 手术后可能会有阴道分泌及/或出血。
2. 手术后首 1-2 天，患者的阴道可能会感到酸痛。
3. 如进行了宫颈锥形切除术，或会有纱布放于阴道内帮助止血，其后会由医生取出。

## 出院后注意事项

1. 数周内可能会有轻微阴道出血及分泌物，请使用卫生棉垫(非卫生棉条)保持清洁。
2. 四星期后可恢复性生活。
3. 手术后可如常洗澡，请勿浸浴直至分泌物完全停止。
4. 术后两星期内或仍有分泌物时，请勿游泳。
5. 活检结果需约四星期。
6. 如阴道持续出血或流出恶臭分泌物、盆腔及腹部疼痛、寒颤、发烧(体温高于 38°C)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
7. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

---

---

---

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询  
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

