



手術資料

前庭大腺囊腫袋形縫合術 Marsupialization of Bartholin Cyst

簡介

前庭大腺位於陰道口兩側，這些腺體會分泌出潤滑液以潤滑陰道。當腺管被阻塞或大腺內液體被感染時，便會導致前庭大腺囊腫。急性發作期可能因細菌感染或炎症發生而形成膿腫。袋形縫合術是一種常見的婦科手術，用以治療前庭大腺囊腫。透過手術建造造袋以供液體排出。當病人出現上述症狀時，醫生便會建議進行此手術。

治療成效

此手術可排出囊腫及膿腫內的液體或膿液，並預防囊腫再生。

手術過程

1. 手術會在局部或全身麻醉下進行；
2. 病人需保持切膀胱切石臥位姿勢；
3. 在囊腫開出小切口；
4. 排出液體；
5. 將內囊壁折回並縫合到皮膚上，製造小袋形；
6. 造袋完成。

可能出現的風險及併發症

1. 感染
2. 出血
3. 囊腫再次形成

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善，仍有出現併發症的風險。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行輸血或另一手術治療這些併發症。

手術前的預備

1. 保持個人衛生可預防外科傷口感染。有見於此，院方建議病人於手術當日清洗身體及頭髮。
2. 醫生會向病人解釋施行手術的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
4. 如有需要，醫護人員會安排病人進行盆腔檢查。
5. 如有需要，護士會安排剃除切口附近的體毛。
6. 護士會給病人外科皂液清洗手術部位。
7. 術前 6 小時禁止飲食。(只適用於全身麻醉)
8. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
9. 手術前請先排清小便。

手術後須知

一般情況

1. 全身麻醉後，病人可能會：
 - 因麻醉時曾插喉而引致喉部輕微不適或疼痛；
 - 出現麻醉藥的副作用，包括疲倦、渴睡、噁心或嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。
2. 此手術需要短暫留院，約兩星期後才可完全康復。

傷口護理

1. 病人應每天洗澡，並保持傷口清潔及乾爽。
2. 術後數星期內，傷口可能會有少量出血或滲液。

飲食

待麻醉藥效消退後，便可逐漸恢復正常飲食。

出院後注意事項

1. 請遵照醫生指示服用藥物。
2. 數週內可能會有輕微陰道出血或分泌，請使用衛生棉墊(非衛生棉條)保持清潔。
3. 如廁後，請小心從前向後擦拭。
4. 手術後四週可恢復性生活。
5. 手術後可如常洗澡，請勿浸浴、使用油性產品及爽身粉，直至分泌物完全停止。
6. 傷口完全癒合前，請勿使用有香味的沐浴產品。
7. 請穿著舒適，透氣的內褲。病人應避免穿著緊身衣服，直至傷口沒有痛感。
8. 術後兩星期內或傷口完全癒合前，請勿進行游泳活動。
9. 如陰道持續出血或流出惡臭分泌物、嚴重疼痛、寒顫、發熱(體溫高達 38°C 或 100.4°F 以上)或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
10. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

