



手术资料

前庭大腺囊肿袋形缝合术 Marsupialization of Bartholin Cyst

简介

前庭大腺位于阴道口两侧，这些腺体会分泌出润滑液以润滑阴道。当腺管被阻塞或大腺内液体被感染时，便会导致前庭大腺囊肿。急性发作期可能因细菌感染或炎症而形成脓肿。袋形缝合术是一种常见的妇科手术，用以治疗前庭大腺囊肿。透过手术制造口袋以供液体排出。当患者出现上述症状时，医生便会建议做此手术。

治疗效果

此手术可排出囊肿及脓肿内的液体或脓液，并预防囊肿再生。

手术过程

1. 手术会在局部或全身麻醉下进行；
2. 患者需保持卧姿；
3. 在囊肿切一小切口；
4. 排出液体；
5. 将内囊壁折回并缝合到皮肤上，制造小袋形；
6. 造袋完成。

可能出现的风险及并发症

1. 感染
2. 出血
3. 囊肿再次形成

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要进行输血或另一手术治疗这些并发症。

手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防刀口感染。患者于手术当天务必洗澡及洗头。
2. 医生会向患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
4. 如有需要，医护人员会安排患者进行盆腔检查。
5. 如有需要，护士会安排剃除切口附近的体毛。
6. 护士会给患者外科皂液清洗手术部位。
7. 术前6小时禁止饮食(只适用于全身麻醉)。
8. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
9. 手术前请先排清小便。

手术后须知

一般情况

1. 全身麻醉后，患者可能会：
 - 因麻醉时曾插管而引致喉部轻微不适或疼痛；
 - 出现麻醉药的副作用，包括疲倦、渴睡、恶心或呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。
2. 此手术需要短暂住院，约两星期后才可完全康复。

刀口护理

1. 患者应每天洗澡，并保持伤口清洁及干爽。
2. 术后数星期内，刀口可能会有少量出血或渗液。

饮食

麻醉药作用消退后，便可逐渐恢复正常饮食。

出院后注意事项

1. 请遵照医生指示服药。
2. 数周内可能会有轻微阴道出血或分泌，请使用卫生棉垫(非卫生棉条)保持清洁。
3. 如厕后，请小心从前向后擦拭。
4. 手术后四周可恢复性生活。
5. 手术后可如常洗澡，请勿浸浴、使用油性产品及爽身粉，直至分泌物完全停止。
6. 刀口完全愈合前，请勿使用有香味的沐浴产品。
7. 请穿舒适，透气的内裤。患者应避免穿紧身衣服，直至刀口没有疼痛。
8. 术后两星期内或刀口完全愈合前，请勿游泳。
9. 如阴道持续出血或流出恶臭分泌物、严重疼痛、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
10. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复，并祝生活愉快！

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

