


手术资料

包皮环切术 (Circumcision)

简介

包皮环切术是用手术的方法，将覆盖在阴茎前龟头外的包皮环形切除。

适应症包括：包皮过长或过紧而引致不能回到原位 / 复发性龟头发炎 / 排尿时尿流受阻形成包皮尿囊，甚至出现排尿困难(包皮囊口狭窄而妨碍排尿)。



治疗效果

因应各种适应症而有所不同，透过手术可切除覆盖在阴茎前龟头外的包皮。

手术过程

1. 手术可在局部或全身麻醉下进行
2. 切除过长的包皮及止血
3. 用可自动溶解的缝线缝合
4. 用敷料包扎阴茎

可能出现的风险及并发症

1. 伤口出血
2. 伤口感染
3. 阴茎瘢痕
4. 附近器官受损(包括龟头或尿道)或切除阴茎皮肤过多
5. 尿道口狭窄
6. 尿道发炎
7. 勃起时感到疼痛

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防刀口感染。
2. 医生会向患者解释施行手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者、父/母或合法监护人明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
4. 手术前一晚须洗澡及洗头，请保持阴茎部位清洁。
5. 术前6小时禁止饮食(只适用于全身麻醉)。
6. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
7. 手术前请先排清小便。

手术后须知

一般情况

1. 全身麻醉后，患者可能会：
 - 因麻醉时曾插管而引致喉部轻微不适或疼痛；
 - 出现麻醉药的副作用，包括疲倦、渴睡、恶心或呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。
2. 如伤口部位疼痛，可通知护士，护士会按医生指示注射止痛针或提供口服止痛药。
3. 手术后当天可出院。

伤口护理

1. 手术后会用消毒纱布覆盖伤口，请保持伤口清洁干燥。
2. 手术对小便并无影响，小便时不会感到疼痛。
3. 小便后，请用生理盐水、蒸馏水或凉开水冲洗伤口。
4. 缝线会在手术后两至四星期自动溶解及吸收，毋需拆线。
5. 龟头会流出红色或黄色黏液，此属正常现象。
6. 伤口会出现浮肿，此属正常现象，会于一至两星期内自然消退。
7. 宜穿宽松及轻便的衣物，避免衣物磨擦及接触伤口。

饮食

待麻醉药作用消退后，便可逐渐恢复正常饮食(只适用于全身麻醉)。

出院后注意事项

1. 如有需要，可服医生处方止痛药。
2. 可咨询医生，何时才可恢复性生活。
3. 如出现轻微渗血，可直接按压出血处。
4. 如伤口部位的疼痛加剧及出现红肿、触痛、有浓性渗液或渗血、排尿困难、寒颤、发烧(体温高达38°C或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
5. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

