



手術資料

各類結節或小腫瘤切除術 Excision of Nodules or Small Lumps

簡介

結節或小腫瘤通常生長於皮層或皮下，常見的小腫瘤包括脂腺瘤、纖維瘤、脂肪瘤、痣或疣等。若腫瘤體積細小及位於皮膚淺層，便可在局部麻醉下以小手術切除。

小腫瘤一般多為良性，但亦有少部份為惡性，所以進行病理檢驗是有需要的。

治療成效

此手術使用介入性外科技術移除身體上可見或可觸摸的小結節或小腫瘤，從而作病理診斷及改善外觀。

手術過程

1. 手術可在局部麻醉或全身麻醉下進行；
2. 待麻醉藥發揮藥效後，便可開始切除小結節或小腫瘤；
3. 最後縫合傷口，然後蓋上敷料。

可能出現的風險及併發症

1. 傷口感染
2. 傷口爆裂
3. 傷口出血

** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善，仍有發生併發症的風險。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術治療這些併發症。

手術前的預備

1. 保持個人衛生可預防外科傷口感染。有見於此，院方建議病人於手術當日清洗身體及頭髮。
2. 醫生會向病人解釋施行手術的原因、程序及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
4. 術前6小時禁止飲食。(只適用於全身麻醉)
5. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
6. 手術前請先排清小便。

手術後須知

一般情況

1. 全身麻醉後，病人可能會：
 - 因麻醉時曾插喉而引致喉部輕微不適或疼痛；
 - 出現麻醉藥的副作用，包括疲倦、渴睡、噁心或嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。
2. 如傷口感到疼痛，可通知護士，護士會按醫生指示為病人注射止痛針或提供口服止痛藥。

傷口處理

1. 手術後，傷口會蓋上無菌敷料以避免感染。
2. 如傷口已貼上防水膠布，病人便可照常淋浴，但請保持傷口清潔乾爽。
3. 病人須按照指定時間回院檢查傷口及拆線，若刀口是以自動溶解的縫線縫合，則毋須拆線。
4. 手術後宜穿寬鬆衣物，以免傷口受壓。

飲食

1. 待麻醉藥效消退後，便可按指示恢復正常飲食。(只適用於全身麻醉)

出院後注意事項

1. 活動：
 - 視乎傷口的位置而定，請向醫生查詢。
 - 在手術後的首四星期，應避免抬舉重物。
 - 醫生會視乎病人的工作性質，給予適當的病假休息。
2. 如傷口部位痛楚加劇及出現紅腫、有膿性滲液或滲血、寒顫、發熱(體溫高達 38°C 或 100.4°F 以上)或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
3. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知