

手術資料

肛門瘻管切開術 Anal Fistulotomy

簡介

肛門瘻管切開術是以外科手術切開肛門瘻管。肛門瘻管是肛門與肛門周邊皮膚之間相連的不正常管道，瘻管通常會在肛腺感染後形成，病人一般會感到肛門疼痛或流出分泌物。

治療成效

此手術可治療肛門瘻管之症狀。透過手術將整條瘻管切開，傷口保持開放，待傷口由再生組織填滿而癒合并預防復發。

手術過程

1. 手術會在全身麻醉下進行
2. 找出所有不正常的管道，然後切開
3. 醫生可能會為病人縫合傷口周邊以促進傷口癒合


可能出現的風險及併發症

1. 感染
2. 大小便失禁
3. 復發

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善，仍有出現併發症的風險。如瘻管復發，便可能需要進行另一手術治療。

手術前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行手術的原因、程序及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 病人請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 術前6小時禁止飲食。
4. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
5. 手術前請先排清小便。



手術後須知

一般情況

1. 全身麻醉後，病人可能會：
 - 因麻醉時曾插喉而引致喉部輕微不適或疼痛；
 - 出現麻醉藥的副作用，包括疲倦、渴睡、噁心或嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。
2. 如傷口感到疼痛，可通知護士，護士會按醫生指示為病人注射止痛針或提供口服止痛藥。

傷口護理

1. 手術後會以紗布覆蓋傷口。
2. 病人可如常沐浴。
3. 如有需要，手術後，醫護人員會按醫囑指導病人施行坐浴。

飲食

1. 待麻醉的藥效過後，按指示恢復正常飲食。
2. 攝取足夠水份和進食纖維豐富的食物，有助大便暢通。

出院後注意事項

1. 傷口通常會在 6 週後癒合。
2. 手術後的數週，如廁時傷口可能會有輕微出血或滲液。
3. 病人可能需要使用紗布片或護墊吸收傷口分泌物。
4. 如有需要，可服用醫生處方之止痛藥，亦可浸泡 15 分鐘的暖水坐浴舒緩痛楚。
5. 如有需要，醫生會處方通便劑以軟化大便。
6. 避免提取重物、進行劇烈運動及游泳，直至傷口完全癒合。
7. 如傷口部位的痛楚加劇及出現紅腫、濃性滲液、大量出血、嘔心或嘔吐、便秘或小便困難、寒顫、發熱(體溫高達 38°C 或 100°F 以上) 或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
8. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知