



## 手术资料

### 肛门瘻管切开术 Anal Fistulotomy

#### 简介

肛门瘻管切开术是通过手术切开肛门瘻管。肛门瘻管是肛门与肛门周边皮肤之间相连的不正常管道，瘻管通常会在肛腺感染后形成，患者一般会感到肛门疼痛或流出分泌物。

#### 治疗效果

此手术可治疗肛门瘻管的症状。透过手术将整条瘻管切开，刀口保持开放，待刀口由再生组织填满而愈合并预防复发。

#### 手术过程

1. 手术会在全身麻醉下进行；
2. 找出所有不正常的管道，然后切开；
3. 医生可能会为患者缝合切口周边以促进刀口愈合。


#### 可能出现的风险及并发症

1. 刀口感染
2. 大小便失禁
3. 复发

\*\* 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如瘻管复发，便可能需要进行另一手术治疗。

#### 手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防刀口感染。患者于手术当天务必洗澡及洗头。
2. 医生会向患者解释施行手术的原因、程序及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 患者请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百达生(Pradaxa)或非类固醇抗炎药，例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中药，请尽早通知医生。
4. 术前6小时禁止饮食。
5. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
6. 手术前请先排清小便。



## 手术后须知

### 一般情况

1. 全身麻醉后，患者可能会：
  - 因麻醉时曾插管而引致喉部轻微不适或疼痛；
  - 出现麻醉药的副作用，包括疲倦、渴睡、恶心或呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。
2. 如刀口部位疼痛，可通知护士，护士会按医生指示注射止痛针或提供口服止痛药。

### 刀口护理

1. 手术后会用消毒纱布覆盖刀口，请保持敷料干燥。
2. 可如常淋浴(如使用防水敷料)，其后请保持刀口清洁干燥。
3. 如有需要，手术后，医护人员会按医嘱指导患者如何坐浴。

### 饮食

1. 麻醉药作用消退后，按指示逐渐恢复正常饮食。
2. 多摄取水分和吃纤维丰富的食品，有助大便畅通。

## 出院后注意事项

1. 刀口通常会在6周后愈合。
2. 手术后数周，如厕时刀口可能会有轻微出血或渗液。
3. 可能需要使用纱布片或护垫吸干刀口分泌物。
4. 如有需要，可服用医生处方止痛药，也可进行15分钟的温水坐浴缓解疼痛。
5. 如有需要，医生会处方通便剂以软化大便。
6. 避免提重物、进行剧烈运动及游泳，直至刀口完全愈合。
7. 如刀口部位的疼痛加剧及出现红肿、浓性渗液、大量出血、呕心或呕吐、便秘或小便困难、寒颤、发烧(体温高达38°C或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
8. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复，并祝生活愉快！

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

---

---

---

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询  
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

