



手术资料

腹腔穿刺术 Abdominal Tapping

简介

腹腔穿刺术是一项外科手术，用于引出腹腔积液(腹水)。腹水是医学用语，描述腹部聚积过多的液体。腹腔内的积液增加，可能会引起腹胀、腹痛、呼吸急促、恶心、呕吐和活动能力降低等症状。

治疗效果

腹腔积液引出后，可缓解不适症状。引出的腹水可作病理学、微生物学或化学分析，医生可从这些分析中获取相关资料以作诊断。


手术过程

1. 手术会在局部麻醉下进行；
2. 患者需平躺或侧卧；
3. 可能需要进行超声波检查以确定积液位置；
4. 把一条引流管插进腹腔，经引流管引出积液；
5. 如有需要，会把少量积液送往病理部进行化验；
6. 引出所有积液后，便可拔出引流管；
7. 用敷料覆盖切口。

可能出现的风险及并发症

1. 刀口出血
2. 刀口感染
3. 手术期间，肠道、膀胱或血管可能会被刺穿
4. 低血压
5. 肾衰竭

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、术后严重出血或渗漏时，可能需要进行手术治疗这些并发症。



图片来源:

https://www.drhc.ae/hs-fs/hubfs/Paracentesis_or_Abdominal_Tapping.jpg?width=1500&name=Paracentesis_or_Abdominal_Tapping.jpg

手术前的准备

1. 医生会向患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物，及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百达生(Pradaxa)或非类固醇抗炎药，例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中药，请尽早通知医生。
3. 现正或怀疑已怀孕的女士，请于术前通知医护人员。
4. 如有需要，请于术前4-6小时禁止饮食。
5. 可能需要接受抽血检查。
6. 请除去身上所有个人物品(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
7. 手术前请先排清小便。

手术后须知

1. 医护人员会为引出大量积液的患者定时监测血压、脉搏及体温。
2. 若感到腹部持续疼痛，可通知护士，护士会按医生指示为患者注射止痛针或提供口服止痛药。
3. 根据排出积液的情况，引流管可在手术后的数小时至48小时内拔除。
4. 通常可即日出院。
5. 腹部的刀口会用防水无菌敷料保护，请保持敷料清洁干燥。如刀口愈合良好，在移除引流管的48小时后，便可将敷料除去。

出院后注意事项

1. 如有需要，可服医生处方止痛药。
2. 如刀口部位的疼痛加剧及出现红肿、触痛、渗脓、渗血、寒颤、发烧(体温高达38°C或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
3. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心治疗，相信您会逐渐康复，并祝生活愉快！

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知