



手術資料

膿瘡切開及引流術 Abscess Incision and Drainage

簡介

膿瘡由膿液積聚而成，伴有紅腫或發炎組織，在身體控制感染時出現，會形成硬塊使病人感到疼痛不適。膿瘡切開及引流術是一項把膿瘡切開，及將受感染的膿液排出的手術。

治療成效

此手術有助排出受感染的膿液，並促進傷口癒合。

程序過程

1. 此程序可在局部或全身麻醉下進行。
2. 在膿瘡上的皮膚開一切口。
3. 引出膿液。
4. 以生理鹽水或消毒液清洗膿腔。
5. 視乎膿瘡的狀況，膿腔可能會以敷料填充，讓可能餘下的膿液引出。
6. 以紗布覆蓋傷口。


可能出現的風險及併發症

1. 疼痛
2. 出血
3. 疤痕
4. 復發

不常見的風險：

膿瘡附近的重要組織如血管或神經線受損

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。



圖片來源：

<https://marmed.com/products/derma-stent/>

手術前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行手術的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物，及因藥物或麻醉而引致的併發症。如正服用影響血液凝固的藥物，例如阿士匹靈(Aspirin)、華法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或 Pradaxa(百達生)或非類固醇抗炎藥，例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中藥，請儘早通知醫生。
3. 如膿瘡較大或位置深入，可能須要接受超聲波或其他醫學影像檢查。
4. 如以全身麻醉進行手術，可能須要接受常規檢驗，例如血液檢驗、心電圖和肺部 X 光。
5. 保持個人衛生可預防外科傷口感染。請於手術當日清洗身體及頭髮。
6. 術前 6 小時禁止飲食。(視乎情況)
7. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
8. 手術前請先排清小便。

手術後須知

1. 手術後的短時間內，請盡量避免傷口受到過度拉扯及活動，以防傷口出血。
2. 傷口以紗布保護並吸收滲液。紗布之下，傷口可能會用特別的敷料填充，以防膿液再積聚及促進傷口癒合。請保持敷料清潔及乾爽。醫生及護士會按個別情況指導病人如何護理傷口。
3. 病人可即日出院。

出院後注意事項

1. 手術後及傷口癒合期間，病人可能會感到疼痛及不適，如有需要，可服用醫生處方之止痛藥。
2. 按醫生指示，於傷口完全癒合前，避免進行劇烈活動及運動。
3. 如傷口部位的痛楚加劇及出現紅腫、觸痛、滲膿、滲血、寒顫、發熱(體溫高達 38°C 或 100°F 以上) 或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
4. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

