



## 手术资料

# 脓疮切开及引流术 Abscess Incision and Drainage

### 简介


脓疮由脓液积聚而成，伴有红肿或发炎组织，在身体控制感染时出现，会形成硬块使患者感到疼痛。脓疮切开及引流术是一项把脓疮切开，将受感染的脓液排出的手术。

### 治疗效果

此手术有助排出受感染的脓液，并促进伤口愈合。

### 手术过程

1. 在局部或全身麻醉下进行。
2. 在脓疮上的皮肤切一切口。
3. 引出脓液。
4. 用生理盐水或消毒液清洗脓腔。
5. 根据脓疮的状况，可能会用敷料填充，将未排干净脓液引出。
6. 以纱布覆盖切口。



图片来源：  
<https://marmed.com/products/derma-stent/>

### 可能出现的风险及并发症

1. 疼痛
2. 出血
3. 疤痕
4. 复发

不常见的风险:

脓疮附近的重要组织如血管或神经受损

\*\* 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。

## 手术前准备

1. 医生会向患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物，及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或 Pradaxa(百达生)或非类固醇抗炎药，例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中药，请尽早通知医生。
3. 如脓疮较大或位置较深，可能需要接受超声波或其他医学影像检查。
4. 如用全身麻醉进行手术，可能须要接受常规检验，例如血液检验、心电图和肺部 X 光。
5. 保持个人卫生可预防刀口感染。请于手术当天洗澡及洗头。
6. 术前 6 小时禁止饮食。(视情况)
7. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
8. 手术前请先排清小便。

## 手术后须知

1. 手术后的短时间内，请尽量避刀口受到过度拉扯及活动，以防刀口出血。
2. 刀口用纱布保护并吸收渗液。刀口可能会用特别的敷料填充，以防脓液再积聚及促进刀口愈合。请保持敷料清洁干燥。医生及护士会按情况指导患者如何护理刀口。
3. 可即日出院。

## 出院后注意事项

1. 手术后及刀口愈合期间，可能会感到疼痛及不适，如有需要，可服医生处方的止痛药。
2. 按医生指示，在刀口完全愈合前，请勿做剧烈活动及运动。
3. 如刀口部位的疼痛加剧及出现红肿、触痛、渗脓、渗血、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
4. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记住相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

---

---

---

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询  
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

