

## 手术资料

# 胸腔引流术 Insertion of Chest Drain

### 简介

胸腔引流术是将一条透明塑料直管(引流管)放入体内，清除胸腔内积存的不正常空气或液体。

### 适应症

1. 气胸(空气由肺部进入胸腔)
2. 血胸(胸腔积血)
3. 胸腔手术或损伤后(气胸或血胸)
4. 脓胸(胸腔积脓)

### 治疗效果

可排出胸腔内积存的不正常的液体及空气，减低胸腔感染及预防并发症发生。

### 手术过程

1. 在局部麻醉下进行
2. 在患侧腋窝下开一切口
3. 把引流管放入胸腔
4. 把引流管外露的末端连接至引流系统
5. 用缝线把引流管固定在胸壁

### 可能出现的风险及并发症

1. 感染
2. 大量出血
3. 附近器官受损
4. 未能排出积聚的空气/液体
5. 移除引流管后漏气，以致需要重新放入引流管
6. 不适当地放入引流管，以致需要更换引流管
7. 皮下气肿(空气积存于皮下组织而形成的气肿)

\*\* 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。

### 手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防刀口感染。患者于手术当天务必洗澡及洗头。
2. 医生会向患者解释施行手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。

## 手术后须知

1. 动作请勿过大或过快，以防引流管滑移。
2. 常作深呼吸能有助排出胸腔内的空气/液体。

## 出院后注意事项

1. 引流管需要放置体内数天，移除引流管后，需进行胸部 X-光检查以确认肺部正常扩张。
2. 如胸部的疼痛加剧、出现呼吸困难、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上) 或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
3. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

---

---

---

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询  
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知