



## 程序資料

### 細針吸取組織檢查術 Fine Needle Aspiration

#### 簡介

細針吸取組織檢查術的目的是抽取腫塊細胞、組織或積液，作進一步檢驗分析。

#### 檢查成效

取出異常組織送往檢驗，以助診斷疾病。

#### 程序過程

1. 此程序可在局部麻醉或無需麻醉下進行。若無需麻醉，病人可能會感到輕微痛楚或不適；
2. 把細針經皮膚穿刺進入腫塊，抽取組織或積液；
3. 若組織或積液樣本不足，便需再次進行穿刺及抽吸；
4. 在針刺部位按壓止血，用敷料覆蓋針刺部位；
5. 將樣本送交病理部作進一步分析。



圖片來源：  
<https://media.sciencephoto.com/image/c0071873/225>

#### 可能出現的風險及併發症

1. 針刺部位出血
2. 針刺部位瘀傷
3. 針刺部位腫脹
4. 感染
5. 附近器官受損 (罕見)

\*\* 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。

#### 程序前的預備

1. 保持個人衛生可預防傷口感染。有見於此，院方建議病人於程序當日清洗身體及頭髮。
2. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、程序及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物，及因藥物或麻醉而引致的併發症。如正服用影響血液凝固的藥物，例如阿士匹靈(Aspirin)、華法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)、百達生(Pradaxa)或中藥，請儘早通知醫生。

## 程序後須知

1. 傷口可能會有輕微出血，可於穿刺部位施壓止血。
2. 針刺的傷口非常小，敷料可於檢查當天稍後時間摘除，或按照醫生指示處理。

## 出院後注意事項

1. 24 小時內避免進行劇烈運動。根據個別情況，病人可能需要更長時間暫停會碰撞的劇烈活動。
2. 如傷口嚴重疼痛、腫脹、滲血、流膿、寒顫、發熱(體溫高達 38°C 或 100.4°F 以上) 或其他異常情況，請即聯絡主診醫生或回院診治。
3. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

---

---

---

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢  
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知