



程序資料

細針吸取組織檢查術 Fine Needle Aspiration

簡介

細針吸取組織檢查術的目的是抽取腫塊細胞、組織或積液，以作進一步分析。

檢查成效

取出異常組織送往化驗，以助診斷疾病。

程序過程

1. 此程序可在局部麻醉或無需麻醉下進行。若無需麻醉，病人可能會在程序期間感到輕微痛楚或不適。
2. 把細針經皮膚穿刺進入腫塊，以抽取組織或積液。
3. 移除細針。若組織或積液樣本不足，便需再次進行穿刺及抽吸。
4. 在針刺部位按壓以止血，以敷料覆蓋針刺部位。
5. 將樣本送交病理部作進一步分析。

可能出現的風險及併發症

1. 出血
2. 瘀傷
3. 腫脹
4. 感染
5. 附近器官受損 (罕見)

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。

程序前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、程序及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物，及因藥物或麻醉而引致的併發症。如正服用影響血液凝固的藥物，例如阿士匹靈(Aspirin)、華法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)、Pradaxa(百達生)或某些中藥，請儘早通知醫生。
3. 保持個人衛生可預防傷口感染，請於程序當日清洗身體及頭髮。

程序後須知

1. 傷口可能會有輕微出血，可於穿刺部位施壓止血。
2. 針刺的傷口非常細小，敷料可於檢查當天的稍後時間拆除，或遵照醫生指示處理。

出院後注意事項

1. 24 小時內避免進行劇烈運動。視乎個別情況，病人可能需要更長時間暫停會碰撞的劇烈活動。
2. 如傷口嚴重疼痛、腫脹、滲血、流膿、寒顫、發熱(體溫高達 38°C 或 100°F 以上) 或其他異常情況，請即聯絡主診醫生或回院診治。
3. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知