



手术资料

细针吸取组织检查术 Fine Needle Aspiration

简介

细针吸取组织检查术的目的是抽取肿块细胞、组织或积液，作进一步检验分析。

检查效果

取出异常组织送往检验，以助诊断疾病。

手术过程

1. 此手术可在局部麻醉或无需麻醉下进行。若无需麻醉，患者可能会感到轻微疼痛或不适；
2. 把细针经皮肤穿刺进入肿块，抽取组织或积液；
3. 若组织或积液标本不足，便需再次进行穿刺及抽吸；
4. 在针刺部位按压止血，用敷料覆盖针刺部位；
5. 将标本送交病理部作进一步分析。



图片来源:

<https://media.sciencephoto.com/image/c0071873/225>

可能出现的风险及并发症

1. 针刺部位出血
2. 针刺部位瘀伤
3. 针刺部位肿胀
4. 感染
5. 附近器官受损 (罕见)

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。

手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防刀口感染。患者于手术当天务必洗澡及洗头。
2. 医生会向患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物，及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)、百达生(Pradaxa)或中药，请尽早通知医生。

手术后须知

1. 刀口可能会有轻微出血，可在穿刺部位施压止血。
2. 针刺的刀口非常小，敷料可在检查当天稍后时间摘除，或按照医生指示处理。

出院后注意事项

1. 24 小时内避免进行剧烈运动。根据个人情况，患者可能需要更长时间暂停会碰撞的剧烈活动。
2. 如刀口严重疼痛、肿胀、渗血、流脓、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上) 或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
3. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心治疗，相信您会逐渐康复，并祝生活愉快！

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知