



程序資料

縫合術 Suturing

簡介

縫合術通常用以縫合表面或較深傷口，把傷口連在一起。

治療成效

縫合術有助傷口正常癒合及減低感染的風險。

治療過程

1. 可在局部、全身或脊髓麻醉下進行；
2. 用生理鹽水或消毒液清洗傷口；
3. 如有需要，把無菌布放在傷口周邊以防止細菌入侵或受污染；
4. 去除明顯污垢或壞死組織；
5. 縫合傷口；
6. 清洗及抹乾傷口，然後蓋上無菌敷料。

可能出現的風險及併發症

1. 傷口感染
2. 傷口裂開
3. 永久性疤痕
4. 形成癍瘤

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。

治療前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行程度的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。

治療後須知

1. 保持敷料清潔乾爽，尤其在首24至48小時內。
2. 請勿進行接觸性運動、游泳或劇烈活動，直至傷口完全癒合及拆線為止。
3. 拆線的時間會視乎傷口部位而有所不同。

出院後注意事項

1. 如傷口部位的痛楚加劇及出現紅腫、觸痛、滲膿、滲血、寒顫、發熱(體溫達 38°C 或 100.4°F 以上)或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
2. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

