



手术资料

缝合术 Suturing

简介

缝合术通常用以缝合表面或较深的伤口。

治疗效果

缝合术有助伤口正常愈合及减低感染的风险。

治疗过程

1. 可在局部、全身或脊髓麻醉下进行；
2. 用生理盐水或消毒液清洗伤口；
3. 如有需要，把无菌布放在伤口周边以防细菌入侵或受污染；
4. 去除明显污垢或坏死组织；
5. 缝合伤口；
6. 清洗及擦干，然后盖上无菌敷料。

可能出现的风险及并发症

1. 伤口感染
2. 伤口裂开
3. 永久性疤痕
4. 形成瘢痕

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。

手术前的准备

1. 医生会向患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。

手术后须知

1. 保持敷料清洁干燥，尤其在首24至48小时内。
2. 请勿进行接触性运动、游泳或剧烈活动，直至伤口完全愈合及拆线为止。
3. 拆线的时间根据伤口部位而有所不同。

出院后注意事项

1. 如伤口部位的疼痛加剧及出现红肿、触痛、渗脓、渗血、寒颤、发烧(体温达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
2. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复，并祝生活愉快！

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

