



程序資料

硬化劑注射療法 Sclerotherapy Injection

簡介

硬化劑注射療法是把藥物直接注射在血管內，藥物刺激血管的內膜，使血管內腫脹及黏附在一起，產生血栓。經過一段日子後，血管內便會形成纖維化組織，然後逐漸消退。

治療成效

可消除靜脈曲張及蜘蛛狀靜脈曲張。

治療過程

1. 毋須在麻醉下進行。
2. 利用細針把藥物直接注射在血管內，期間可能會有 1 至 2 分鐘輕微不適及絞痛抽搐。

可能出現的風險及併發症

1. 輕微的影響，如痕癢
2. 注射部位發紅
3. 注射位置附近出現瘀傷
4. 較大的靜脈變成硬塊及硬化
5. 短暫性色素沉澱
6. 新血管形成

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。

治療前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行治療的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。如正服用影響血液凝固的藥物，例如阿士匹靈(Aspirin)、華法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百達生(Pradaxa)及中藥，請儘早通知醫生。
3. 請避免在患肢塗搽乳液。
4. 懷孕、餵哺母乳、慢性病患者或長期臥床患者不宜進行此治療。

出院後注意事項

1. 穿著壓力襪以加壓治療中的血管。
2. 如有需要，可服用醫生處方之止痛藥。
3. 最少 48 小時，請勿：
 - 服用阿士匹靈、布洛芬或其他消炎藥物
 - 進行熱水浴
 - 進行按摩浴或桑拿浴
 - 直接暴露在陽光下
4. 可如常沐浴，可使用少量肥皂及溫水清洗注射部位。
5. 請勿在治療後的 2 天內進行任何帶氧體能活動。
6. 如傷口部位的痛楚加劇及出現紅腫、腹股溝 5 吋內發炎、患肢突然腫脹發作、注射部位輕微潰瘍、寒顫、發熱(體溫達 38°C 或 100.4°F 以上)或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
7. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知